


**GBA** *Sphyraena barracuda*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Barracuda



Livrée argentée. **1** Barres fugaces sur les flancs, surtout vers la caudale. **2** Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. En général, **3** taches noires éparses sur le bas du corps. **4** Pointe blanche sur une ou plusieurs nageoires.


Longueur maximale : 170 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

**YBS** *Sphyraena forsteri*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Bécune de Forster



Long corps cylindrique et **1** grande mâchoire inférieure proéminente. Haut du corps gris bleuté ; flancs et ventre argentés. **2** Tache noire derrière la base des pectorales. **3** Seconde dorsale et anale sombres ; extrémité blanche.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

**BAC** *Sphyraena jello*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Bécune jello



Haut du corps gris bleuté, flancs et ventre argentés. Environ **1** vingt barres verticales courtes sur le corps s'étendant jusqu'en-dessous de la ligne latérale. **2** Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. **3** Reflets jaunes sur la seconde dorsale et la caudale.

Longueur maximale : 140 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Sphyraena genie* mais s'en distingue par des reflets jaunes sur la dorsale et la caudale (caudale de *S. genie* bordée de noir).


Bécune obtuse

Long corps cylindrique et mâchoire inférieure proéminente. Corps argenté avec **1** deux bandes longitudinales fugaces brunes ou jaune brunâtre. **2** Reflets jaunes sur la caudale.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Photo : CSIRO Australian National Fish Collection



Ressemble à *Sphyraena flavicauda* (pas de photo) mais s'en distingue par l'absence de barres verticales courtes sur le corps. La répartition exacte de *S. obtusata* est méconnue en raison de la confusion entre les deux espèces.


Bécune chevronnée

Livrée gris argenté. **1** Nombreuses barres en chevron prononcées sur les flancs. **2** Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. **3** Caudale sombre.

Longueur maximale : 90 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Photo : CSIRO Australian National Fish Collection




Ressemble à *Sphyraena qenie* mais s'en distingue par des barres plus prononcées en forme de chevron sur les flancs. La répartition exacte de *S. putnamae* est méconnue en raison de la confusion avec *S. qenie*.

Bécune bandes noires

Livrée gris argenté. **1** Environ 18 à 22 barres sombres rectilignes ou légèrement en chevron sur les flancs. **2** Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. **3** Caudale sombre bordée de noir.

Longueur maximale : 160 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Sphyraena putnamae* mais s'en distingue par des barres rectilignes sur les flancs. La répartition exacte de *S. qenie* est méconnue en raison de la confusion avec *S. putnamae*.