
Guide d'identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie

Brad Moore et Boris Colas



Pacific Community
Communauté du Pacifique

Pacific Community
Communauté du Pacifique

Guide d'identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie

Brad Moore et Boris Colas
Programme pêche côtière
Communauté du Pacifique (CPS), Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Australian Aid

UNION EUROPÉENNE

© Communauté du Pacifique (CPS) 2017
Tous droits réservés de reproduction ou de traduction à des fins commerciales/lucratives, sous quelque forme que ce soit. La Communauté du Pacifique autorise la reproduction ou la traduction partielle de ce document à des fins scientifiques ou éducatives ou pour les besoins de la recherche, à condition qu'il soit fait mention de la CPS et de la source. L'autorisation de la reproduction et/ou de la traduction intégrale ou partielle de ce document, sous quelque forme que ce soit, à des fins commerciales/lucratives ou à titre gratuit, doit être sollicitée au préalable par écrit. Il est interdit de modifier ou de publier séparément des graphismes originaux de la CPS sans autorisation préalable.

Texte original : anglais

Communauté du Pacifique, catalogage avant publication (CIP)

Moore, Bradley

Guide d'identification des poissons côtiers les plus consommés en Océanie / Brad Moore et Boris Colas

1. Marine fishes – Classification – Oceania.
2. Fishery management – Oceania.
3. Fishes – Identification – Oceania.

I. Moore, Bradley II. Colas, Boris
III. Titre IV. Communauté du Pacifique

338.3720995 AACR2

ISBN: 978-982-00-0962-2

Préparé pour publication au siège de la de la Communauté du Pacifique à Nouméa (Nouvelle-Calédonie).
Communauté du Pacifique
BP D5, 98848 Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie)
Téléphone : +687 26 20 00 ; Télécopie : +687 26 38 18
Courriel : spc@spc.int ; http://www.spc.int/

Imprimé par Stredder Print Ltd (Nouvelle-Zélande).
2017

Remerciements

La Communauté du Pacifique (CPS) exprime sa gratitude aux personnes qui ont contribué à la réalisation du présent guide par leur aide et leur soutien. La plupart des photographies ont été fournies par John E. (Jack) Randall, auquel nous sommes particulièrement redevables. Alastair Graham, du Centre australien pour la recherche scientifique et industrielle (CSIRO), a aimablement fourni plusieurs clichés extraits de la collection australienne d'ichtyologie conservée par le CSIRO. Les autres sources photographiques sont indiquées aux pages correspondantes.

Au sein de la CPS, nous remercions Céline Barré, Ian Bertram, Lindsay Chapman, Aymeric Desurmont et Franck Magron pour leurs conseils et observations utiles dans divers domaines. Joelle Albert (WorldFish), Pauline Bosserelle (Service de l'environnement de Wallis et Futuna), Eric Cruz (Administration nationale des océans et de l'atmosphère, ministère du Commerce des États-Unis), Peter Last (CSIRO), Andrew Olds (Université de la Sunshine Coast), Will White (CSIRO) et Ashley Williams (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences) ont fourni des commentaires sur le présent guide et/ou des renseignements sur la répartition de certaines espèces. L'élaboration et la publication du guide ont bénéficié du concours financier du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce et de l'Union européenne, au titre de son projet Soutien scientifique à la gestion des pêcheries côtières et hauturières dans la region océanienne (SciCOFish).

Enfin, nous tenons à remercier la Direction de l'environnement de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, la Direction des ressources marines et minières de Polynésie française et le Service de la pêche et de la gestion des ressources marines de Wallis et Futuna qui ont contribué au financement de l'impression de cette version française du guide.

PROVINCE SUD
NOUVELLE-CALÉDONIE

DIRECTION DES RESSOURCES MARINES ET MINIERES
PU FA'AHOTU MOANA

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Introduction

L'identification précise des espèces exploitées est essentielle à la gestion efficace de l'activité de pêche. Le présent guide vise à faciliter l'identification des espèces de requins, de raies et de poissons téléostéens les plus fréquemment observés dans les captures de pêche vivrière et sur les marchés au poisson des pays insulaires du Pacifique. Bien que destiné en premier lieu aux agents des services des pêches et de l'environnement océaniens chargés de répertorier les prises ou les espèces vendues sur les étals des marchés, le guide devrait renseigner utilement les étudiants, les partenaires non gouvernementaux, les pêcheurs et les membres du public s'intéressant aux poissons. L'ouvrage vise à aider les observateurs œuvrant en Océanie à identifier avec précision les espèces rencontrées et, ce faisant, à renforcer les compétences des agents concernés, à consolider le recueil des données sur la pêche et à améliorer la gestion des ressources halieutiques côtières de la région.

L'Océanie abrite plusieurs milliers d'espèces de poissons. Beaucoup font l'objet d'une pêche commerciale, artisanale ou vivrière importante, tandis que de nombreux autres y échappent. Le présent guide recense environ 320 espèces côtières et littorales parmi celles les plus couramment observées dans les relevés de prises ou sur les marchés de la région. Nous tenons à souligner que la liste proposée n'a pas pour vocation d'être exhaustive, et qu'elle omet sans doute certaines espèces susceptibles d'être observées. Ajoutons qu'à quelques exceptions près, le présent guide ne traite pas des espèces ciblées par les pêcheries hauturières à la senne et à la palangre, les pêcheries de vivaneaux d'eaux profondes, ou encore les pêcheries d'invertébrés. La Communauté du Pacifique (CPS) a produit d'excellents manuels d'identification des espèces en question, dont on trouvera la liste dans la section Bibliographie, en pages 132–133.

Les agents des services des pêches sont invités à faire usage du présent guide en lien avec les méthodes décrites dans le manuel de la CPS intitulé *Creel and market surveys: A manual for Pacific Island fisheries officers* (« Enquêtes auprès des pêcheurs et relevés sur les marchés : un manuel destiné aux agents des pêches de l'Océanie », disponible en anglais seulement). L'utilisation conjointe de ces supports contribuera à harmoniser les méthodes d'enquête et d'identification des espèces dans l'ensemble de la région.

Les informations fournies reposent sur les meilleures données disponibles à l'heure de la rédaction du présent guide. Il ne fait aucun doute que des études et des enquêtes plus poussées feront apparaître de nouvelles espèces d'intérêt dans la Région, étofferont les connaissances sur la répartition des espèces, ou induiront des modifications taxonomiques. La CPS entend tenir ce guide de référence à jour. Les auteurs invitent les lecteurs à leur adresser toute suggestion de mise à jour à l'adresse suivante : cfpinfo@spc.int.

Comment utiliser ce guide

Les espèces décrites dans le présent guide sont regroupées par famille taxonomique. Réparties en deux grandes catégories, à savoir les « élasmobranches » (requins et raies) et les « téléostéens » (poissons osseux), les familles sont ensuite présentées par ordre alphabétique (nom scientifique). Un code couleur permet de différencier les familles et de s'orienter aisément et rapidement entre ces dernières. Une clé d'identification des familles décrites dans le présent ouvrage est proposée aux pages 8–9 ; on y trouvera, pour chaque famille, le croquis d'un spécimen représentatif ; le nom (nom scientifique et nom(s) commun(s)) ; et le numéro des pages où sont décrites les espèces concernées.


À l'intérieur de chaque famille, les espèces sont classées par ordre alphabétique en fonction de leur nom scientifique. L'emploi du nom scientifique contribue à harmoniser la description des espèces à l'échelle régionale et mondiale. La première partie du nom scientifique correspond au genre, et la seconde désigne l'espèce.

Les informations relatives à chaque espèce sont présentées dans l'ordre suivant : nom de la famille (nom scientifique et nom commun), nom de l'espèce (nom scientifique et nom(s) commun(s)), et code d'identification de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le code normalisé de la FAO est indiqué dès lors qu'il existe. Lorsqu'une espèce en est dépourvue, c'est le code d'identification du genre (par ex., *Acanthurus*) ou de la famille (par ex., Acanthuridae) qui est utilisé. Le(s) nom(s) commun(s) le(s) plus usité(s), et notamment celui/ceux préconisé(s) par la FAO, figure(nt) sous le nom scientifique.

Chaque espèce est ensuite illustrée à l'aide d'une photographie accompagnée des principaux caractères anatomiques de l'animal et assortie d'une brève description en encadré. À quelques exceptions près, tous les clichés représentent des poissons morts et, ce, afin de refléter au mieux l'état et la couleur des spécimens rencontrés par les agents des services des pêches lors des relevés de prises ou des enquêtes sur les marchés. Lorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir une photographie de spécimen mort, celle-ci a été remplacée par un cliché de poisson vivant, en pleine eau. Les principaux caractères anatomiques de certaines espèces sont illustrés à l'aide de dessins. De manière générale, chaque espèce est représentée par un seul spécimen, à l'exception des celles présentant des variations considérables selon le sexe, la phase du cycle de vie, ou l'individu. La description fournie pour chaque espèce est concise, et fait ressortir les principales caractéristiques permettant de la différencier avec fiabilité d'autres espèces de même aspect. Par souci de cohérence,

la terminologie employée pour décrire les espèces est globalement identique à celle utilisée dans d'autres publications de référence. On trouvera aux pages 6–7 des schémas illustrant certains caractères d'identification employés dans les descriptifs.

Sous la description de chaque espèce figure sa longueur maximale (en cm) afin d'en faciliter l'identification. La rencontre d'un spécimen de taille supérieure à la longueur maximale indiquée sera rare, et pourra résulter d'une erreur d'identification. Chez les espèces pourvues d'une nageoire caudale arrondie ou tronquée (voir description page 6) et chez les requins, la longueur maximale est exprimée en longueur totale (LT – généralement mesurée entre l'extrémité antérieure du poisson [pointe des lèvres ou du museau] et l'extrémité de la nageoire caudale). Chez les espèces dotées d'une nageoire caudale émarginée, en croissant de lune ou fourchue, on utilise la « longueur à la fourche » (LF – mesurée à partir de l'extrémité antérieure du poisson jusqu'au milieu, ou fourche, de la nageoire caudale). En effet, ce type de nageoire caudale présente souvent des pointes endommagées, empêchant de mesurer de manière précise la longueur totale des poissons. Chez les raies, on mesure la largeur du disque (LD).



Suivent ensuite des informations sur la présence ou l'absence de l'espèce dans chaque État et Territoire insulaire océanien, extraites de bases de données électroniques, d'inventaires récents, d'articles scientifiques et de rapports techniques. Chaque État ou Territoire est désigné par son code à deux lettres de l'Organisation internationale de normalisation.

AS	Samoa américaines
CK	Îles Cook
FJ	Fidji
FM	États fédérés de Micronésie
GU	Guam
KI	Kiribati
MH	Îles Marshall
MP	Îles Mariannes du Nord
NC	Nouvelle-Calédonie
NR	Nauru
NU	Niue
PF	Polynésie française
PG	Papouasie-Nouvelle-Guinée
PN	Îles Pitcairn
PW	Palau
SB	Îles Salomon
TK	Tokelau
TO	Tonga
TV	Tuvalu
VU	Vanuatu
WF	Wallis et Futuna
WS	Samoa

Un code couleur à trois nuances est ensuite utilisé pour préciser si l'espèce a été observée (sombre), si sa présence est possible (clair) ou si son absence est probable (blanc à bord coloré) dans chaque État et Territoire de la région.

NC = espèce préalablement observée dans l'État ou le Territoire (ici, Nouvelle-Calédonie).


PF = espèce n'ayant pas encore été observée dans l'État ou le Territoire (ici, Polynésie française), mais dont la présence est possible compte tenu de l'existence d'habitats adaptés et de sa présence attestée dans les États et/ou Territoires voisins.

WF = espèce qui n'a pas encore été signalée dans l'État ou le Territoire (ici, Wallis et Futuna), et dont la présence est peu probable faute d'habitat adapté et/ou compte tenu de l'absence de l'espèce dans les États et/ou Territoires voisins.


Depuis la publication de la version anglaise de ce guide en 2016, les informations sur la présence ou l'absence des espèces ont été mises à jour suite à la publication de nouvelles données scientifiques.


Sous certaines photographies figurent des observations sur des espèces d'aspect similaire, et les principales caractéristiques permettant de les différencier.

La description des espèces se referme sur une liste de publications dont la lecture est recommandée pour faciliter l'identification d'espèces autres que celles présentées dans le présent guide, telles que les poissons d'aquariophilie. Un index est proposé en fin d'ouvrage afin d'aider le lecteur à retrouver aisément et rapidement le groupe, la famille ou l'espèce recherchée.




Caractéristiques externes







Différents types de nageoire caudale









Marques



Barres
Trait
Petits points
Selle
Tache


Rayure
Lignes



Bandes
Points

Familles décrites dans le présent guide :


Élasmobranches (requins et raies)




Carcharhinidae
(Requins)
p. 10–11



Sphyrnidae
(Requins-marteaux)
p. 12




Aetobatidae
(Raies léopards)
p. 13




Dasyatidae
(Raies pastenagues)
p. 14


Téléostéens (poissons osseux)



Acanthuridae
(Chirurgiens, nasons)
p. 15–24




Albulidae
(Albulidés, bananes de mer)
p. 25




Balistidae
(Balistes)
p. 26




Belonidae
(Aiguillettes)
p. 27




Caesonidae
(Fusiliers)
p. 28–29




Carangidae
(Carangues)
p. 30–37




Chanidae
(Chanidés)
p. 38




Congridae
(Congres)
p. 39




Coryphaenidae
(Coryphènes)
p. 40




Ephippidae
(Platax)
p. 41




Gerreidae
(Blanches)
p. 42–43




Haemulidae
(Diagrammes)
p. 44–47




Holocentridae
(Poissons-soldats et marignans)
p. 48–53




Kyphosidae
(Calicagères)
p. 54




Labridae
(Labres)
p. 55–58




Leiognathidae
(Leiognathidés)
p. 59




Lethrinidae
(Empereurs)
p. 60–67



Lutjanidae
(Vivaneaux, lutjans)
p. 68–77




Megalopidae
(Tarpons)
p. 78




Monodactylidae
(Monodactylidés)
p. 79




Mugilidae
(Mulets)
p. 80–81



Mullidae
(Rougets-barbets)
p. 82–86




Muraenidae
(Murènes)
p. 87




Polynemidae
(Polynémidés)
p. 88




Priacanthidae
(Beauclaires)
p. 89




Scaridae
(Perroquets)
p. 90–104




Scombridae
(Thons, thazards)
p. 105–107




Serranidae
(Mérous, vieilles, loches)
p. 108–122




Siganidae
(Sigans)
p. 123–127



Sphyraenidae
(Barracudas, bécunes)
p. 128–129



Terapontidae
(Térapontidés)
p. 130




Zanclidae
(Zanclidés)
p. 131

ALS *Carcharhinus albimarginatus*

Carcharhinidae / Requins

Requin pointe blanche



Haut du corps gris, bas du corps blanc. 1 Pointe blanche sur les lobes de la première dorsale, des pectorales et de la caudale.


Longueur maximale : 300 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AML *Carcharhinus amblyrhynchos*

Carcharhinidae / Requins

Requin dagsit, requin gris de récif



Haut du corps gris ; bas du corps blanc. 1 Seconde dorsale, anale et face intérieure des pectorales noires. 2 Large bord noir sur la caudale.

Longueur maximale : 240 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CCE *Carcharhinus leucas*

Carcharhinidae / Requins

Requin bouledogue



Grand corps trapu. 1 Museau court et émoussé, œil petit. Haut du corps gris ; bas du corps blanc. Nageoires dépourvues de marques distinctives.

Longueur maximale : 400 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Carcharhinus limbatus CCL

Requin bordé

Haut du corps gris, bas du corps blanc. ❶ En général, pointes ou bords noirs sur les pectorales, dorsales, pelviennes et caudale. ❷ Nageoire anale pâle à blanche.

Longueur maximale : 275 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Carcharhinus melanopterus BLR


Requin pointes noires

Haut du corps gris brunâtre à gris jaunâtre, bas du corps blanc. ❶ Pointe noire caractéristique sur les deux dorsales, les pectorales, l'anale et la caudale. ❷ Bande sombre marquée des flancs aux nageoires pelviennes.

Longueur maximale : 200 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Photo : CSIRO Australian National Fish Collection




Triaenodon obesus TRB

Requin corail


Haut du corps gris brunâtre, bas du corps blanc. En général, ❶ quelques taches gris foncé sur le corps. ❷ Pointe blanche caractéristique sur la première nageoire dorsale et le haut de la nageoire caudale.

Longueur maximale : 210 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Requin-marteau halicorne



Ressemble à *Sphyrna mokarran* (pas de photo) mais s'en distingue par le bordant de sa tête, beaucoup plus incurvé (quasi-rectiligne chez *S. mokarran*).

Haut du corps gris brunâtre, bas du corps blanc. (i) Bord antérieur de la tête incurvé avec une encoche médiane très marquée, et deux encoches moins prononcées de chaque côté.

Longueur maximale : 400 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Requin à pointes blanches (*Carcarhinus albimarginatus*), au marché au poisson de Tanjung Luar, à Lombok (Indonésie).

Photo : Will White, CSIRO Australian National Fish Collection

Aetobatus ocellatus MAO

Raie léopard

Face dorsale vert brunâtre. ❶ Nombreux points blancs ; face ventrale pâle. ❷ Museau aplati, en bec de canard. ❸ Longue queue en forme de fouet; épines venimeuses près de sa base.

Largeur maximale : 300 cm LD

AS	CK	FJ	FM	**GU**	KI
MH	MP	NC	NR	NU	**PF**
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		





Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Appartient à un groupe d'espèces proches d'aspect, autrefois assimilées à *Aetobatus narinari*. Sans doute présente dans tout le Pacifique occidental et central, *A. ocellatus* y est peut-être prise pour *A. narinari*. De nouvelles études devront confirmer la répartition d'*A. ocellatus* dans le Pacifique.



Raie léopard (*Aetobatus ocellatus*), Honolulu, Hawaï.

Photo : Zachary Bass, Flickr

DHF *Himantura fai*

Dasyatidae / Raies pastenagues

Raie fouet




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Disque en forme de losange. Face dorsale gris clair à brun rosé. 1 Museau en pointe arrondie. 2 Queue longue et effilée, généralement pourvue d'un seul dard venimeux, situé à deux longueurs de dard de la base de la queue.

Largeur maximale : 185 cm LD

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	**PF**
PG	PN	**PW**	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

RDK *Neotrygon kuhlii*

Dasyatidae / Raies pastenagues

Raie pastenague à points bleus




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Disque en forme de losange. Face dorsale brun jaunâtre à rougeâtre, tachetée de 1 points bleus de taille variable bordés de sombre. 2 Queue rayée de noir et de blanc vers son extrémité et pourvue de deux dards venimeux.

Largeur maximale : 47 cm LD

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Appartient à un groupe d'espèces proches d'aspect incluant *N. australiae* (sud PG et nord-est Australie) et *N. trigonoides* (est Australie et NC). A ce jour, presence de *N. kuhlii* confirmée seulement en SB ; répartition dans le Pacifique à confirmer.

RTY *Taeniura lymma*

Dasyatidae / Raies pastenagues

Raie pastenague queue ruban




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Disque ovale. Face dorsale mordorée constellée de 1 gros points bleu vif. 2 Queue à ruban aplatie striée d'une bande bleue sur chaque côté, et pourvue de 3 deux dards vers son extrémité.

Largeur maximale : 35 cm LD

AS	CK	**FJ**	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		

Ressemble à *Taeniura lessoni* (pas de photo), mais s'en distingue par deux rayures bleues sur la caudale. Présence de *T. lessoni* confirmée uniquement en Mélanésie.

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Acanthurus achilles AXQ

Chirurgien d'Achille

Livrée bleu marine à noire. ❶ Tache orange distinctive en forme de goutte, située à l'arrière du corps, englobant les scalpels. ❷ Bord de l'opercule blanc et ❸ liserés bleu blanchâtre et orange à la base des dorsale et anale. ❹ Large bande orange sur la caudale.

Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Acanthurus auranticavus AXQ

Chirurgien chaussette orange

Tête et corps brun orangé à bruns. Tête dépourvue de taches. ❶ Trait sombre derrière le haut de l'opercule. ❷ Œil et ❸ scalpels cernés d'orange. ❹ Base de la caudale cerclée d'un anneau blanc.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Acanthurus bariene AQR

Chiurgien tache noire

Livrée mordorée à brune. ❶ Dorsale jaune. ❷ Tache noire à l'arrière de l'œil et ❸ barre jaune derrière l'opercule. ❹ Chez l'adulte, museau arrondi caractéristique.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



DGV *Acanthurus blochii*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien queue rayée




Photo : Biodiversity Institute of Onatrio

Livrée bleu foncé à brun bleuté. ❶ Nombreuses lignes sinueuses sur la tête et l'avant du corps. ❷ Petite tache ocre derrière l'œil. ❸ Liseré noir bleuté autour du scalpel. Caudale sans tache, souvent cerclée d'un ❹ anneau blanc autour de sa base.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AXQ *Acanthurus dussumieri*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien couronné




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Corps brun bleuté à mordoré. ❶ Lignes irrégulières sur la tête et le corps et ❷ rayure jaune en travers de l'œil. ❸ Dorsale et anale à dominante jaune ; liseré bleu à leur base. ❹ Nombreux points sombres sur la caudale bleutée.


Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AXQ *Acanthurus guttatus*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien moucheté



Robe gris-brun à grise. ❶ Barres blanches sur la tête et sur l'avant du corps. ❷ Nombreux points sur les deux-tiers postérieurs du corps. ❸ Pelviennes jaunes caractéristiques. Base de la caudale crème ; bord extérieur noir.

Longueur maximale : 26 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Acanthurus leucocheilus AXQ

Chirurgien lèvres pâles

Livrée brune. ❶ Coloration noire autour et sur l'arrière des lèvres. ❷ Marge intérieure blanche à jaune sur la pectorale ❸ Scalpel blanc caractéristique.

Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Acanthurus lineatus AQI

Chirurgien bandes bleues

Fond jaune sur les trois quarts supérieurs du corps et ❶ nombreuses rayures longitudinales caractéristiques bleues bordées de noir. ❷ Ventre bleu-gris pâle sans rayure. ❸ Pelviennes jaunes et liséré bleu vif sur la plupart des nageoires.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Acanthurus maculiceps AXQ

Chirurgien tête tachetée

Corps brun à brun-gris orné de ❶ nombreuses lignes longitudinales jaune pâle très fines. ❷ Tête noirâtre avec de nombreux points blancs. ❸ Trait noir derrière le haut de l'opercule.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



DGV *Acanthurus mata*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien élancé




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée grise à bleu pâle. ❶ Nombreuses lignes longitudinales bleu foncé sur la tête et le corps. ❷ Petit point noirâtre sur le bord supérieur de l'opercule. ❸ Deux bandes jaunes devant les yeux fusionnant à l'arrière de l'œil. ❹ Lèvre supérieure jaunâtre.


Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AXQ *Acanthurus nigricans*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien joue blanche



Livrée brun foncé à bleu marine ou noire. ❶ Tache blanche caractéristique sur la joue, sous l'œil, et ❷ anneau blanc derrière les lèvres. ❸ Bande verticale jaune sur caudale blanche. ❹ Bande jaune à la base des dorsale et anale sombres ; scalpel jaune.


Longueur maximale : 22 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AXQ *Acanthurus nigricauda*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien virgule noire



Livrée brune à grise. ❶ Long trait horizontal noir derrière l'œil. ❷ Mince trait noir sur le scalpel s'étendant vers l'avant. ❸ Tiers distal des pectorales jaune. ❹ Liseré bleu sur la dorsale et l'anale.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Acanthurus nigrofuscus AQN

Chirurgien brun

Livrée brun bleuté à brune. ❶ Nombreux points orange sur la tête. ❷ Points bleu foncé à noirs à la base postérieure des dorsale et anale. ❸ Mince liseré pâle sur le bord distal de la caudale.

Longueur maximale : 21 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Ctenochaetus striatus* mais s'en distingue par ses points noirs à l'arrière des nageoires dorsale et anale.

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Acanthurus nigroris AXQ

Chirurgien lignes bleues

Livrée brune, avec de ❶ nombreuses lignes bleu pâle sur la tête et le corps. ❷ Petite tache sombre à la base postérieure des dorsale et anale.

Longueur maximale : 23 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Acanthurus nigrofuscus* mais s'en distingue par la présence de lignes bleues sur la tête, à la place de points orange.

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Acanthurus olivaceus AQV

Chirurgien bande orange

Adulte (photo) brun foncé à gris. ❶ Bande horizontale caractéristique, orange bordée de sombre (bleu ou violet), du haut de l'opercule vers l'arrière du corps. ❷ Petits points gris-noir sur la caudale ; épaisse marge blanche dans la fourche. Juvénile à dominante jaune, possédant également une bande orange caractéristique sur le haut de l'opercule.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



AXQ *Acanthurus pyroferus*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien porteur de feu



Livrée brun jaunâtre à brun foncé. 1 Bande noire incurvée du menton jusqu'au bord supérieur de l'opercule. 2 Bande blanche formant un cercle quasi-complet autour des lèvres noires. 3 Tache orange au-dessus de la base des pectorales. 4 Caudale sombre bordée de jaune.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AQT *Acanthurus triostegus*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien bagnard



Livrée gris olive sur le dos et le haut du corps, blanche ailleurs. 1 Cinq barres verticales étroites et noires sur le corps et une sur la tête, en travers des yeux.


Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AXQ *Acanthurus xanthopterus*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien pectorale jaune



Livrée bleue à brun grisâtre. 1 Tache jaune sur les yeux et 2 pectorales jaunes. Possède souvent 3 un anneau blanc à la base de la caudale. 4 Bandes jaunes et bleues sur la dorsale et l'anale.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Ctenochaetus striatus TCV

Chirurgien strié

Livrée gris-brun foncé à brun orangé. ❶ Nombreux points orange sur la tête et ❷ lignes bleues sur le corps.

Longueur maximale : 26 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Acanthurus nigrofuscus* mais s'en distingue par l'absence de taches noires à l'arrière des dorsale et anale.

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Naso annulatus SUR

Nason rostre long

Livrée gris bleuté, olive ou brune. ❶ Lèvres blanches et ❷ liserés pâles sur les dorsale et anale. Le juvénile et le sub-adulte (photo) ont ❸ un anneau blanc sur le pédoncule caudal. L'adulte (pas de photo) a une longue corne qui prolonge le front bien au-delà de la bouche.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Naso brachycentron SUR

Nason à bosse

❶ Haut du corps gris olive, ventre pâle. ❷ Bosse caractéristique sur la tête. Le mâle adulte possède une longue corne qui s'étend au-delà de la bouche ; ❸ bosse de taille réduite chez la femelle.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



NAB *Naso brevirostris* — Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Nason rostre court



Livrée gris bleuté à brune. ❶ Points sur la tête et lignes verticales sur le corps, s'achevant en points sur le ventre (peu visibles sur la photo). ❷ Longue corne sur le front, devant les yeux. ❸ Caudale à dominante blanche.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SUR *Naso caesius* — Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Nason queue bleue



Livrée gris bleuté à brun-gris foncé. ❶ Caudale bleue. ❷ Absence de corne sur la tête.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SUR *Naso hexacanthus* — Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Nason lisse



Haut du corps brun à gris bleuté, ventre gris jaunâtre. ❶ Absence de corne sur le front. Marques noires sur les joues et ❷ liseré noir sur l'opercule.

Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Naso lituratus NAI

Nason à éperons oranges

Livrée gris brunâtre. ❶ Lèvres, anale et scalpel orange. ❷ Zone noire ourlée de jaune de la bouche aux yeux. ❸ Dorsale à fond noir, bordée de bleu pâle et d'un liseré bleu à sa base. ❹ Caudale grise à marge intérieure jaune pâle, et prolongée de longs filaments chez le mâle adulte.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Naso lopezi SUR

Nason allongé

Haut du corps gris bleuté orné de ❶ nombreux petits points gris foncé à noirs (formant parfois de petites bandes), ventre plus pâle. ❷ Absence de corne sur la tête. ❸ Parfois, grande zone pâle autour des pectorales.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Acanthuridae / Chirurgiens, nasons


Naso tonganus SUR

Nason rastapopoulos

Haut du corps gris à olive ; ventre plus pâle ; nombreux petits points noirs sur le corps. ❶ Bosse caractéristique sur le dos et ❷ nez bulbeux.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Naso tuberosus*, présent dans l'océan Indien, mais s'en distingue par l'absence de grande tache noire sur la poitrine.

NAS *Naso unicornis*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Nason à éperons bleus




Photo : Brad Moore, SPC

Haut du corps gris-olive ; face ventrale plus pâle. 1 Scalpel bleu. 2 Petite corne sur la tête devant les yeux ne dépassant pas la bouche. 3 Liserés bleus sur les dorsale et anale, et parfois, coloration bleue autour des pectorales.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SUR *Naso vlamingii*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Nason lèvres bleues




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée brun-gris à gris bleuté. 1 Lignes verticales bleu foncé sur les flancs, prolongées de points bleu foncé de part et d'autre. 2 Lèvres bleues et bande horizontale bleue devant les yeux. Bosse caractéristique sur le front juste en dessous des yeux. 3 Caudale légèrement arrondie, prolongée de longs filaments bleus.


Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

ZEV *Zebrasoma velifer*

Acanthuridae / Chirurgiens, nasons

Chirurgien à voile



1 Alternance de barres brun-gris et blanc grisâtre parcourues de lignes jaunes plus fines. 2 Petits points blancs nombreux et rapprochés sur la tête. 3 Caudale unie, blanche à mordorée. 4 Grandes dorsale et anale caractéristiques.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Banane lèvre ronde

Tête et corps argentés. ❶ Marque sombre fréquente au bout du museau. ❷ Partie antérieure de la mâchoire inférieure arrondie.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Albula argentea* (pas de photo) mais s'en distingue par l'absence de tache jaune à la base des pectorales.




Banane lèvre ronde (*Albula glossodonta*) en vente sur l'atoll d'Abemama, à Kiribati. Photo : Brad Moore, SPC

BDZ *Balistoides viridescens*

Balistidae / Balistes

Baliste olivâtre



Corps sombre orné de 1 motifs en croisillon vert-jaune à bleus. 2 Bande brun foncé en travers du museau et au-dessus de la lèvre supérieure. 3 Seconde dorsale, anale et caudale orange-jaune ; base et bords sombres.


Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CNT *Canthidermis maculata*

Balistidae / Balistes

Baliste rude



Corps allongé, gris bleuâtre pâle à gris noirâtre, souvent pourvu de 1 points blancs s'estompant avec l'âge et d'une tache sombre autour de la base des pectorales.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

UBV *Pseudobalistes flavimarginatus*

Balistidae / Balistes

Baliste géant



Livrée bleue à bleu violacé ou brun clair. Taches sombres et 1 motif en croisillon sur le corps. 2 Marges des nageoires jaunes à orange, précédées de bleu clair sur la seconde dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Tylosurus crocodilus crocodilus BTS

Aiguillette crocodile

Corps effilé argenté. ❶ Mâchoires supérieure et inférieure allongées, et dents acérées en aiguilles. ❷ Lobe inférieur de la caudale plus développé que le lobe supérieur.

Longueur maximale : 135 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Platybelone argalus* (pas de photo) mais s'en distingue par sa caudale dont le lobe inférieur est plus long que le lobe supérieur (caudale homocerque chez *P. argalus*).

Strongylura incisa BEN

Aiguillette dentée

Livrée vert grisâtre à argentée. Corps long et effilé. ❶ Mâchoires supérieure et inférieure allongées et dents acérées en aiguilles. ❷ Caudale tronquée à légèrement émarginée.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



CJC *Caesio caerulaurea*

Caesionidae / Fusiliers

Caesio azuror



Livrée bleu argenté. 1 Rayure jaune au-dessus de la ligne latérale, allant de la tête au pédoncule caudal. 2 Traits noirs sur les lobes de la caudale.

Longueur maximale : 32 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CJU *Caesio cuning*

Caesionidae / Fusiliers

Caesio à ventre rouge



Haut du corps bleu grisâtre ; ventre rose blanchâtre. 1 Caudale jaune.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

IFK *Caesio teres*

Caesionidae / Fusiliers

Fusilier à dos jaune et bleu



Livrée gris argenté. 1 Caudale et pédoncule jaune vif. 2 Base des pectorales noire.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Pterocaesio marri TZX

Fusilier de Marr

Livrée bleu argenté à bleu-vert. ❶ Rayure jaune le long de la ligne latérale, s'achevant au pédoncule caudal. ❷ Ligne jaune sur le haut du dos. ❸ Pointes foncées sur les lobes de la caudale.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Pterocaesio tile UDK

Fusilier à ligne olive

Haut du corps bleu argenté, bas du corps rose argenté. ❶ Rayure sombre le long de la ligne latérale jusqu'à la caudale. ❷ Écailles à bord noir sur le dos, formant un motif linéaire. ❸ Traits noirs sur les lobes de la caudale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Pterocaesio trilineata TZX

Fusilier à trois bandes

Haut du corps vert bleuté avec ❶ trois larges rayures mordorées sur le dos ; bas du corps blanc rosé. ❷ Pointes sombres sur les lobes de la caudale.

Longueur maximale : 18 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



LIJ *Alectis ciliaris*

Carangidae / Carangues

Cordonnier fil, carangue échevelée



Haut du corps bleu argenté, bas du corps argent. 1 Front abrupt. 2 En phase juvénile (photo), premiers rayons des dorsale et anale extrêmement longs et filamenteux.


Longueur maximale : 130 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

TUM *Atule mate*

Carangidae / Carangues

Sélar queue jaune



Haut du corps vert bleuté à argenté, bas du corps argent. 1 Tache noire prononcée sur le bord supérieur de l'opercule. Souvent, 2 nombreuses barres sombres sur les flancs. 3 Caudale jaune ; dorsales et 4 pectorales translucides, avec des reflets jaunes.


Longueur maximale : 28 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

NGJ *Carangoides bajad*

Carangidae / Carangues

Carangue lentigine



Livrée argentée à orange jaunâtre. 1 Nombreuses petites taches orange sur les flancs. 2 En général, nageoires orange jaunâtre.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Carangoides chrysophrys NGH

Carangue tapir

Livrée argentée. ❶ Tache noire sur le bord supérieur de l'opercule.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	**FJ**	FM	GU	KI
MH	**MP**	**NC**	**NR**	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	**WF**	WS		




Carangoides ferdau CRF

Carangue rayée

Livrée argentée. En général, ❶ flancs ornés de 5 à 7 barres verticales. ❷ Marge sombre sur la caudale.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	**NR**	NU	**PF**
PG	**PN**	**PW**	**SB**	**TK**	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		




Carangoides fulvoguttatus NGU

Carangue pailletée

Livrée argentée parsemée de ❶ nombreux petits points cuivrés ; parfois, barres sombres fugaces sur les flancs. Chez l'adulte de grande taille, flancs ornés de 3 à 4 taches noires (absentes sur la photo).

Longueur maximale : 120 cm LF


AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	**NR**	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	WS		



NGT *Carangoides orthogrammus*

Carangidae / Carangues

Carangue points jaunes



Livrée argentée. ❶ Points ou taches jaunes et, parfois, barres fugaces sur les flancs. ❷ Nageoires teintées de bleu.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

GSP *Carangoides plagiotaenia*

Carangidae / Carangues

Carangue joue barrée



Livrée argentée. ❶ Opercule bordé d'une ligne noire prononcée.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

NXI *Caranx ignobilis*

Carangidae / Carangues

Carangue têtue



Haut du corps sombre ou gris argenté, bas du corps argent. ❶ Nombreuses taches noires sur les flancs. ❷ Front abrupt chez l'adulte de grande taille. ❸ Petite zone noire à la base supérieure des pectorales.


Longueur maximale : 160 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Caranx lugubris NXU

Carangue noire

Haut du corps gris-olive foncé à presque noir, bas du corps gris argenté. ❶ Petite tache noire sur le bord supérieur de l'opercule. ❷ Scutelles et ❸ seconde dorsale, anale et caudale foncées.




Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Caranx melampygus NXM

Carangue aile bleue

Livrée argentée à vert bleuté. ❶ Nombreux points bleus et noirs sur les deux tiers supérieurs du corps. ❷ Dorsales, anale et caudale bleu vif.




Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Caranx papuensis NXP

Carangue cuivrée

Livrée argentée à reflets bronze à bleu verdâtre. ❶ Points noirs sur les flancs. ❷ Tache blanche derrière la marge supérieure de l'opercule. ❸ Lobe inférieur de la caudale jaune bordé de blanc.




Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CXS *Caranx sexfasciatus*

Carangidae / Carangues

Carangue vorace



Livrée argentée. 1 Petite tache noire sur l'opercule et 2 pointes blanches sur les lobes de la seconde dorsale et de l'anale.


Longueur maximale : 85 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

NXT *Caranx tille*

Carangidae / Carangues

Carangue tille



Corps élancé à la livrée argentée.
1 Front et museau abrupts.
2 Tache noire sur la marge supérieure de l'opercule.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

MSD *Decapterus macarellus*

Carangidae / Carangues

Comète maquereau, carangue maquereau



Livrée argentée. 1 Petite tache noire sur la marge supérieure de l'opercule au niveau de l'œil.
2 La mâchoire ne se prolonge pas jusqu'aux yeux.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Carangidae / Carangues


Elagatis bipinnulata RRU

Comète saumon

Haut du corps bleu olive, bas du corps blanc verdâtre. ❶ Deux rayures longitudinales bleu clair sur les flancs, de la tête à la caudale, souvent séparées par une rayure olive jaunâtre.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Carangidae / Carangues


Gnathanodon speciosus GLT

Carangue royale

Chez l'adulte (photo), livrée gris argenté, ❶ barres à peines visibles et ❷ tête et corps parsemés de taches noires. Juvénile jaune, aux motifs similaires bien que plus marqués.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Carangidae / Carangues


Scomberoides lysan OBY

Sauteur sabre

Corps allongé, argenté. ❶ Double rangée de taches rondes et sombres sur les flancs.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



OBJ *Scomberoides tol*

Carangidae / Carangues

Sauteur leurre




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Corps allongé ; dos bleu argenté, ventre argent ou blanc. 1 Possède 5 à 8 taches oblongues ou ovales au niveau ou au-dessus de la ligne latérale. 2 Rayons mous de la partie postérieure de la dorsale et de l'anale formant des pinnules semi-détachées. 3 Pointes noires sur la dorsale souple et la caudale.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LRO *Selar boops*

Carangidae / Carangues

Sélar oeil de boeuf



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée argentée. Gros œil et 1 rayure horizontale jaune de la tête à la caudale. 2 Tache noire souvent présente sur la marge supérieure de l'opercule. 3 Scutelles saillantes du milieu du corps à la caudale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Selar crumenophthalmus* mais s'en distingue par ses scutelles qui s'étendent plus loin le long du corps. (*S. crumenophthalmus* n'en possède que sur le tiers post. du corps).

BIS *Selar crumenophthalmus*

Carangidae / Carangues

Sélar coulisou



Livrée argentée. Gros oeil et 1 rayure horizontale jaune de la tête au pédoncule caudal. 2 Scutelles saillantes sur le tiers postérieur de la ligne latérale.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Selar boops* mais s'en distingue par ses scutelles confinées au tiers post. du corps (chez *S. boops*, les scutelles s'étendent de la caudale jusqu'à mi-corps).

Seriola dumerili AMB

Sériole couronnée

Haut du corps gris olive argenté, bas du corps argenté. ❶ Bande mordoré foncé allant de la lèvre à la base de la dorsale en passant par l'oeil. Parfois, ❷ rayure ambrée de l'opercule à la caudale.

Longueur maximale : 160 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *S. rivoliana* (pas de photo) mais s'en distingue par une seconde dorsale plus basse (la seconde dorsale de *S. rivoliana* est 4 à 5 fois plus haute que la première).


Trachinotus baillonii TBA

Pompaneau muscadin

Haut du corps argent bleuté, bas du corps argenté. ❶ Flancs ornés de 1 à 5 points noirs bien visibles. ❷ Lobes antérieurs de la seconde dorsale et l'anale allongés.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Trachinotus blochii POO

Pompaneau lune

Haut du corps argent bleuté ; bas du corps argenté ou doré. ❶ Front et museau abrupts. ❷ Bout du museau et lèvres dorés. ❸ Nageoires jaunes à gris jaunâtre. Pas de point sur les flancs.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Chanos chanos

Chano, poisson lait



Livrée argentée. 1 Une seule nageoire dorsale. 2 Pelviennes à mi-corps sous la dorsale.

Longueur maximale : 150 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Jeune garçon tenant un poison lait (*Chanos chanos*). Photo : WorldFish


Conger cinereus COI

Congre à moustache

Livrée gris brunâtre, souvent zébrée de barres noires sur les flancs. ❶ Zone noire sur les pectorales et ❷ trait noir sur la lèvre supérieure, sous les yeux.

Longueur maximale : 130 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Coryphène commune, mahi-mahi




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée argent bleuté à reflets jaunes s'estompant rapidement après la mort. Front haut et abrupt chez le mâle, I plus arrondi chez la femelle.

Longueur maximale : 180 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Mâle Femelle



Coryphènes (*Coryphaena hippurus*) au marché au poisson de Kedonganan, à Bali (Indonésie). Photo : Brad Moore, SPC


Platax boersii BAT

Platax doré

Livrée argentée jaunâtre. ❶ Barre verticale foncée fugace en travers de l'œil. ❷ Seconde barre verticale sur le corps traversant les pectorales.

Longueur maximale : 45 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Platax orbicularis* mais s'en distingue par l'absence de points sur le corps.


Platax orbicularis LXR

Platax rond

Adulte (photo) gris argenté ; ❶ barre verticale étroite foncée traversant les yeux et ❷ barre verticale plus large sur l'avant du corps traversant les pectorales. En général, quelques points noirs épars sur le corps. Juvéniles brun-rouge clair à jaunes avec une barre vertical foncée traversant les yeux ; dorsale et anale très allongées.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Platax boersii* mais s'en distingue par la présence de points noirs épars sur le corps.

Platax teira BAO

Platax à longues nageoires

Livrée argentée. ❶ Barre verticale foncée à pâle traversant les yeux et seconde barre traversant les pectorales. ❷ Une grosse tache foncée située au-dessus du bord postérieur de la pelvienne le distingue des autres platax d'Océanie.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		





Photo : Richard Ling, Flickr

MOJ *Gerres erythrourus*

Gerreidae / Blanches

Blanche haute



Livrée argentée. Souvent, 1 barres sombres à pâles sur le corps (peu visibles sur la photo) et caudale sombre. 2 Pelviennes et anale jaunes.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

GEF *Gerres filamentosus*

Gerreidae / Blanches

Blanche fil



Livrée argentée. Points noirs oblongs formant 7 à 10 bandes verticales sur le haut du corps. 1 2e rayon épineux prolongé en un filament grêle. 2 Pointe du lobe inférieur de la caudale, extrémité de l'anale, et pointe des pelviennes blanches. 3 Petits points triangulaires noir grisâtre sur la dorsale.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

GTV *Gerres longirostris*

Gerreidae / Blanches

Blanche armée



Livrée argentée. Points noirs oblongs formant 6 à 9 bandes verticales sur le haut du corps (peu visibles sur la photo). 1 Deuxième rayon épineux légèrement allongé. 2 Pas de noir sur les extrémités de la dorsale.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Gerres oblongus GEO

Blanche élégante

Livrée argentée. Points oblongs formant sur le corps des rayures verticales discontinues fugaces, notamment chez les petits individus (LF < 10 cm) (peu visibles sur la photo).

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Gerres oyena GEJ

Blanche commune

Livrée argentée. Parfois orné de 6 à 8 barres verticales (plus prononcées chez les juvéniles). ❶ pointe sombre sur la dorsale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



DGP *Diagramma pictum*

Diagramme voilier




Adulte gris bleuté ; taches sombres éparses sur le corps et points discrets sur le corps et les nageoires, s'estompant avec l'âge. Sous-adulte (photo) plus pâle ; 1 nombreux points dorés sur le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

PBX *Plectorhinchus albovittatus*

Diagramme taches blanches




Livrée grise. 1 Large barre foncée fugace derrière les pectorales (peu visible sur la photo). 2 Pelviennes noires. 3 Dorsale souple, anale et caudale bordées de noir.

Longueur maximale : 100 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	VU	WF	WS		

PBX *Plectorhinchus chaetodonoides*

Diagramme arlequin



Chez l'adulte, haut du corps vert pâle et bas du corps gris clair. 1 Grosses taches rondes noires nombreuses et denses sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	**NU**	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	WS		

Ressemble à *Plectorhinchus picus* mais s'en distingue par l'absence de liseré noir sur l'opercule et par ses taches beaucoup plus grosses.


Plectorhinchus chrysotaenia PBX

Diagramme raies d'or

Livrée bleu argenté. ❶ Nombreuses rayures longitudinales jaunes sur la tête et le corps. ❷ Nageoires jaune vif.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		




Plectorhinchus Flavomaculatus PFV

Diagramme citron

Livrée grise. ❶ Points dorés sur le corps, la dorsale et la caudale, fusionnant en ❷ lignes sinueuses sur la tête.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Plectorhinchus gibbosus IEW

Diagramme noir

Corps et ❶ nageoires gris foncé à bruns, et tête anthracite. ❷ Écailles ourlées de sombre et ❸ marge noire sur la joue et l'opercule.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	**WS**		



GFH *Plectorhinchus lessonii*

Diagramme rayé




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection


1 Livrée blanche, ornée de 4 à 5 rayures longitudinales brun noirâtre sur la tête et le haut du corps, et 2 bas du corps blanc uniforme. 3 Points noirs sur la dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	**FJ**	FM	GU	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

IEY *Plectorhinchus lineatus*

Diagramme à bandes diagonales




Haut du corps gris ; bas du corps blanc. 1 Nombreuses rayures obliques noires se délitant en points sur le ventre. 2 Lèvres et nageoires jaunes. 3 Points noirs sur la dorsale, l'anale et la caudale ; et 4 grosse tache rouge à la base supérieure des pectorales.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	MP	**NC**	NR	**NU**	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		

PBX *Plectorhinchus picus*

Diagramme grosses lèvres



Livrée grise à blanc verdâtre. 1 Nombreux petits points noirs sur la tête et le corps, et la dorsale, l'anale et la caudale. 2 Liseré noir à l'arrière des opercules.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	**PF**
PG	PN	**PW**	SB	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	WS		

Ressemble à *Plectorhinchus chaetodonoides* mais s'en distingue par des points beaucoup plus petits et un liseré noir sur l'opercule.


Plectorhinchus vittatus PBX


Diagramme bagnard

Livrée blanche. ❶ Nombreuses rayures longitudinales noires sur la tête et le corps. ❷ Lèvres et nageoires jaunes. ❸ Points noirs sur la dorsale, l'anale et la caudale. ❹ Zones rouges autour de l'opercule et à la base des pectorales et des pelviennes.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		






Banc de diagrammes bagnards (*Plectorhinchus vittatus*), Maldives. Photo : Malcolm Browne, Flickr

YDX *Myripristis adusta*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Soldat pourpre



Livrée saumon argenté. 1 Écailles à bord sombre, en particulier sur le haut du corps. 2 Tache noir rougeâtre sur la marge distale de l'opercule et 3 marges noir rougeâtre sur la dorsale souple, l'anale et la caudale.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

YDX *Myripristis amaena*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Soldat brique



Livrée rouge argenté. 1 Écailles à bord sombre et 2 bande rouge foncé sur la marge de l'opercule. 3 Dorsales, anale et caudale rouges sans marge blanche.

Longueur maximale : 27 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Myripristis violacea* mais s'en distingue par l'absence de marge blanche sur la dorsale souple, l'anale et la caudale.

YJW *Myripristis berndti*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Marignan à œillères



Livrée blanche à reflets rouges et 1 écailles à bord rouge. 2 Marge sombre sur l'opercule et 3 marges blanches sur la dorsale souple, l'anale et la caudale. 4 Partie extrême de la dorsale épineuse orange-jaune.

Longueur maximale : 28 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Myripristis kuntee* mais s'en distingue par ses écailles beaucoup plus grandes et une robe d'apparence plus rouge.


Myripristis kuntee YJZ

Marignan ardoisé

Livrée orange-rouge argenté. ❶ Écailles à bord plus foncé. Petites écailles comparées aux autres poissons-soldats. ❷ Partie extérieure de la dorsale épineuse jaune à jaune orangé ; ❸ dorsale souple, pelviennes, anale et caudale bordées de blanc. Espèce de petite taille, dépassant rarement 15 cm de LF.

Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Myripristis berndti* mais s'en distingue par des écailles beaucoup plus petites et une robe d'apparence plus orange.


Myripristis murdjan HMJ

Soldat pomme de pin

Livrée rose à argentée. ❶ Écailles à bord rouge et ❷ marge brun rougeâtre sur l'opercule. ❸ Dorsale épineuse rouge et ❹ marges étroites et blanches sur la dorsale souple, les pelviennes, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Myripristis pralinia YDX

Soldat écarlate

Haut du corps rouge, bas du corps argenté. ❶ Écailles à bord plus foncé. ❷ Marge brune sur le haut de l'opercule et ❸ tache brun rougeâtre à la base des pectorales. ❹ Dorsale souple, pelviennes, anale et caudale bordées de blanc.

Longueur maximale : 20 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



YDX *Myripristis violacea*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Soldat violacé



Ressemble à *Myripristis amaena* mais s'en distingue par la présence de marges blanches sur la dorsale souple, l'anale et la caudale.

Livrée rose argenté. 1 Écailles à bord foncé et 2 bande rouge sur la marge de l'opercule. 3 Dorsale souple, pelviennes, anale et caudale rouges bordées de blanc.


Longueur maximale : 22 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

YKC *Myripristis vittata*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Soldat pointes blanches



Corps rouge orangé. 1 Marge légèrement sombre sur l'opercule. 2 Extrémité des épines dorsales blanche, et 3 liseré blanc sur la dorsale souple, les pelviennes, l'anale et la caudale.


Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

HCZ *Neoniphon opercularis*

Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Marignan aile noire



Livrée argentée à rouge foncé. 1 Taches noir rougeâtre sur les écailles, et légère iridescence jaune et verte sur l'ensemble du corps. 2 Dorsale épineuse sombre avec des 3 pointes blanches et des taches blanches à la base de chaque membrane.

Longueur maximale : 32 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Neoniphon sammara NHS

Marignan tacheté

Livrée argentée. ❶ Fines rayures rouge foncé à noirâtre. ❷ Extrémité des épines dorsales blanche et ❸ grande tache noire sur les trois premières membranes suivie d'une ❹ bande rouge foncé de largeur décroissante.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Sargocentron caudimaculatum HSU

Marignan rouge et argent

Tête et avant du corps rouge ; ❶ arrière du corps blanc et pédoncule caudal argentés. ❷ Petit trait blanc au-dessus de la marge supérieure de l'opercule.

Longueur maximale : 23 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Sargocentron cornutum HCZ

Marignan à taches noires

Livrée rouge orangé. ❶ Rayures longitudinales blanches sur le corps. ❷ Tache noir rougeâtre au milieu du pédoncule caudal.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



HVS *Sargocentron spiniferum* Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Marignan sabre




Livrée rouge. 1 Écailles à bord blanc argenté et 2 tache rouge oblongue derrière les yeux. 3 Grande épine sur la joue.

Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

HCZ *Sargocentron tiere* Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Marignan tahitien




Livrée rouge. 1 Rayures bleues iridescentes sur les flancs, plus visibles sur le bas du corps. 2 Dorsale épineuse rouge à pointes blanches.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

HCZ *Sargocentron tiereoides* Holocentridae / Poissons-soldats et marignans

Marignan rosé



Livrée rouge. 1 Rayures longitudinales rose argenté sur le corps. 2 Bande rouge vif sous les extrémités blanches de la dorsale épineuse.

Longueur maximale : 16 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Sargocentron violaceum

Marignan violacé

Corps brun violacé, tête rouge. ❶ Traits verticaux blanc argenté à argent bleuté sur les écailles du corps. ❷ Marge postérieure de l'opercule foncée. ❸ Bande rouge vif juste sous le bord de la dorsale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		






Marignan rouge et argent (*Sargocentron caudimaculatum*), Sulawesi (Indonésie).

Photo : Bernard Dupont, Flickr

KYB *Kyphosus bigibbus*

Kyphosidae / Calicagères

Calicagère brune



Ressemble à *Kyphosus vaigiensis* mais la projection du bord postérieur de l'anale se situe en avant de l'alignement du lobe supérieur de la caudale

Livrée gris argenté ; rayures brunes à bronze. 1 Nageoires gris foncé. 2 Seconde dorsale non protubérante, et 3 projection du bord postérieur de l'anale en avant de l'alignement du lobe supérieur de la caudale.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

KYC *Kyphosus cinerascens*

Kyphosidae / Calicagères

Calicagère bleue



Ressemble à *Kyphosus vaigiensis* mais s'en distingue par une nageoire dorsale souple beaucoup plus haute.

Livrée gris argenté. 1 Rayures étroites brunes à bronze. 2 Partie souple de la dorsale plus élevée que l'épine la plus haute.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

KYV *Kyphosus vaigiensis*

Kyphosidae / Calicagères

Calicagère lignes jaunes



Ressemble à *Kyphosus cinerascens* mais s'en distingue par une dorsale souple plus basse.

Livrée gris argenté. 1 Rayures étroites, brunes à bronze. 2 Partie souple de la dorsale non protubérante. 3 Projection du bord postérieur de l'anale dans l'alignement du lobe supérieur de la caudale.

Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Labridae / Labres

Bodianus loxozonus BDY

Labre tache en biais

Livrée orange à rouge orangé. ❶ Nombreuses lignes longitudinales bleu pâle sur la tête, se poursuivant en pointillés le long du corps jusqu'à la caudale. L'adulte possède généralement ❷ une grosse tache noire vers l'arrière du corps, qui s'étend vers le lobe inférieur de la caudale.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Labridae / Labres

Bodianus mesothorax BDY

Labre moitié

Corps blanc jaunâtre. Tête brun violacé et ❶ large bande noire sur l'avant du corps. ❷ Point noir à la base des pectorales.

Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Labridae / Labres


Cheilinus chlorourus JBK

Labre tacheté

Livrée de couleur variable mais généralement brun rougeâtre à gris verdâtre. Souvent, ❶ rangée de points roses ou blancs sur les flancs et ❷ taches blanches sur le dos jusqu'à la base de la dorsale. ❸ Points blancs sur les pelviennes, l'anale, la dorsale et la caudale. Caudale arrondie aux lobes allongés chez les individus plus âgés.

Longueur maximale : 36 cm LT


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



HIF *Cheilinus fasciatus*

Labridae / Labres

Labre poitrine rouge



❶ Livrée rouge orangé à brun rougeâtre vers l'arrière de la tête et l'avant du corps. ❷ Alternance de barres verticales noires et blanches sur les flancs jusqu'aux nageoires. ❸ Lignes orange rayonnant à partir des yeux.


Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


HUU *Cheilinus trilobatus*

Labridae / Labres

Labre triple queue



Adulte



Juvénile

En phase terminale, livrée brun verdâtre. ❶ Écailles du corps bordées d'un liseré vertical rouge et ❷ petits points rouges et lignes irrégulières sur la tête. ❸ Deux barres verticales pâles sur la caudale. ❹ Caudale arrondie aux lobes allongés chez les individus plus âgés.
En phase initiale, tête brun verdâtre et corps vert blanchâtre avec ❺ quatre larges barres verticales sur les flancs.

Longueur maximale : 45 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Cheilinus undulatus HVM

Napoléon


En phase terminale, livrée verte et tête bleue. ❶ Marques sinueuses en labyrinthe, sur la tête et le thorax. ❷ Bosse prononcée au-dessus des yeux.
En phase initiale, livrée olive à vert bleuâtre ; traits verticaux sombres sur le corps et ❸ deux lignes sombres derrière l'œil.

Longueur maximale : 170 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Adulte



Juvénile


Choerodon anchorago OFW

Maidague défense

Tête et haut du corps gris verdâtre ; bas du corps blanc à bleu pâle. ❶ Marque noire rectangulaire sur le haut des flancs et ❷ petits points orange sur la tête.

Longueur maximale : 50 cm LT


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



ODJ *Choerodon schoenleinii*

Labridae / Labres

Maidague tache noire



En phase terminale (photo), haut du corps gris verdâtre et bas du corps jaune. 1 Points bleus fusionnant en traits sur le corps près de la caudale. 2 Petite tache noire à mi-dorsale, sur la base de la nageoire. En phase initiale, flancs jaune doré.


Longueur maximale : 90 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		

EBI *Epibulus insidiator*

Labridae / Labres

Labre insidieux



1 Mâchoire protractile caractéristique de longueur égale à la moitié du corps en extension. En phase terminale, tête blanche et corps sombre. En phase initiale (photo) : livrée jaune clair à marron foncé ; 2 écailles ourlées de noir ou tête, corps et nageoires jaune vif.


Longueur maximale : 35 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	**NR**	**NU**	**PF**
PG	PN	**PW**	**SB**	**TK**	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

IBW *Hemigymnus melapterus*

Labridae / Labres

Tamarin vert



En phase terminale (photo) : tête et avant du corps gris blanchâtre, arrière du corps noir avec 1 des traits ou taches clairs sur la plupart des écailles. 2 Lèvres charnues. En phase initiale, coloration analogue mais caudale jaune.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		


Leiognathus equulus LGE

Sapsap commun

Livrée argentée. Souvent, ❶ barres verticales fugaces sur le dos. Parfois, ❷ tache sombre sur le front.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Leiognathus fasciatus* mais ne possède pas de deuxième épine dorsale allongée.


Leiognathus fasciatus LGS

Sapsap rayé

Livrée argentée. ❶ Deuxième épine dorsale allongée. Possède souvent ❷ une à deux rangées de taches jaune orangé sur les flancs.

Longueur maximale : 20 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



GXR *Gnathodentex aureolineatus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur lignes d'or



Livrée gris argenté à brun rougeâtre. 1 Rangées d'écailles sombres sur le dos, au-dessus de la ligne latérale et 2 quatre à cinq rayures doré brunâtre en dessous. 3 Grosse tache jaune à la base arrière de la caudale. 4 Dorsale souple, anale et caudale bordées de rouge.


Longueur maximale : 28 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

GMQ *Gymnocranius euanus*

Lethrinidae / Empereurs

Bossu blanc à points noirs



Livrée gris argenté. 1 Points noirs épars sur le corps. Possède souvent 2 une bande noire sur la joue, en dessous de l'œil.

Longueur maximale : 42 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

GMW *Gymnocranius grandoculis*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur tatoué



Chez l'adulte (photo), livrée gris argenté, généralement dépourvue de marques hormis 1 des lignes sinueuses bleues sur le museau et les joues. Barres fugaces sur les flancs et en travers des yeux chez le juvénile.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Gymnocranius griseus GMR

Empereur gris

Livrée gris argenté. ❶ plusieurs barres verticales sombres et irrégulières sur la tête et le corps.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Jim Greenfield, Fishbase

Gymnocranius microdon LBR

Empereur argenté

Livrée gris argenté. ❶ Écailles au centre sombres sur le dos, plus pâles sur le bas du corps. ❷ Barre sombre en travers des yeux (estompée sur l'image). ❸ Lobes de la caudale pointus.

Longueur maximale : 42 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lethrinus amboinensis LLB

Empereur ambon

Livrée brun verdâtre pâle à marbré avec des reflets argentés. ❶ Museau légèrement convexe des lèvres aux yeux (museau concave chez la plupart des empereurs). Souvent, ❷ petites taches noires étalées sur plusieurs écailles.

Longueur maximale : 60 cm LF


AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	**NR**	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	**TK**	TO
TV	VU	**WF**	**WS**		



LTT *Lethrinus atkinsoni*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur queue jaune



Livrée argentée à brun olive. 1 Caudale et pédoncule dont la couleur jaune se prolonge parfois en bande jusqu'aux pectorales. 2 Touche de jaune au-dessus de l'œil. Front abrupt caractéristique chez les individus plus grands.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LXE *Lethrinus erythracanthus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur capitaine



Chez l'adulte, livrée brun rougeâtre à brun grisâtre. Souvent, 1 points dorés épars sur le corps et 2 points orange jaunâtre sur la tête. 3 Nageoires allant du jaune à l'orange et au rouge. 4 Points bleus sur la dorsale et l'anale.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LTY *Lethrinus erythropterus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur grandes nageoires



Corps rouge à mordoré, nageoires rouges. Souvent, 1 barres verticales fugaces sur le corps et 2 deux barres plus marquées sur le pédoncule caudal (peu visibles sur la photo).

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Lethrinus genivittatus IDW

Empereur longue-épine

Corps brun argenté avec ❶ des barres verticales brunes et une tête brun clair. ❷ Tache carrée au-dessus des pectorales. ❸ Deuxième épine dorsale allongée en filament grêle.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Lethrinus harak LTK

Empereur Saint Pierre

Livrée gris pâle à gris verdâtre. ❶ Tâche horizontale oblongue et sombre sur le flanc. ❷ Bord des écailles brun.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Lethrinus laticaudis LTI

Empereur large queue

Corps brun clair à jaune ou brun parsemé de ❶ taches irrégulières. Tête brune ou jaune avec des points bleus sur les joues et ❷ courtes rayures bleues disposées en soleil sur le museau et derrière les yeux.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

LTS *Lethrinus lentjan*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur lentille



Livrée gris argenté. 1 Trait rouge vif sur le bord externe de l'opercule. Possède souvent une tache rouge sur la base supérieure des pectorales.


Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LHI *Lethrinus miniatus*

Lethrinidae / Empereurs

Gueule rouge



Corps gris, tête brun rougeâtre. 1 Coloration orange à rouge vif sur la dorsale épineuse, la base des pectorales, autour des yeux et à l'intérieur de la bouche.


Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LHN *Lethrinus nebulosus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur moris



Haut du corps gris verdâtre, bas du corps gris argenté. 1 Écailles pourvues de deux points, l'un noir et l'autre bleu pâle ou blanc, leur donnant un aspect « étoilé ». 2 Traits bleus sur les joues rayonnant à partir des yeux.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Lethrinus obsoletus LWO

Empereur à bandes oranges

Haut du corps gris pâle à brun clair marbré, olive ou brun ; bas du corps plus clair. ❶ Rayure longitudinale unique caractéristique sur la moitié inférieure du corps avec, de part et d'autre ❷ des rayures orange jaunâtre plus fines et peu visibles.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Biodiversity Institute of Onatrio

Lethrinus olivaceus LHO

Empereur gueule longue

Corps allongé caractéristique et ❶ long museau pointu. Livrée grise à gris olive. Souvent, ❷ lignes sinueuses sur le museau.

Longueur maximale : 95 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lethrinus ornatus LQO

Empereur orné

Livrée argentée. ❶ Larges rayures orange jaunâtre sur les flancs. ❷ Joue et opercule bordés de rouge.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



LHB *Lethrinus rubrioperculatus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur honteux



Livrée argent à brune. 1 Taches sombres sur le corps. 2 Tache rouge vif sur le haut de l'opercule.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LZX *Lethrinus semicinctus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur maillé



Corps brun à gris olive, souvent avec une tête jaune à brun jaunâtre. 1 Courte bande oblique et sombre derrière l'opercule et 2 tache sombre sur la partie postérieur du corps.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LHV *Lethrinus variegatus*

Lethrinidae / Empereurs

Empereur bas cou



Corps petit et allongé. 1 Haut du corps brun verdâtre à jaunâtre ; bas du corps presque blanc. 2 Les écailles situées sur le haut du corps sont ornées d'un point gris brunâtre clair leur donnant un aspect linéaire.

Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Lethrinidae / Empereurs

Lethrinus xanthochilus LXN

Empereur bec-de-cane

Corps allongé gris argenté à olive, d'aspect souvent marbré. ❶ Lèvre supérieure jaune et ❷ tache rouge orangé vif à la base des pectorales.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Lethrinidae / Empereurs


Monotaxis grandoculis MXG

Empereur bossu

Chez l'adulte (photo), livrée grise à argentée ou brune ; ❶ front abrupt et gros œil. ❷ Pointes rouges sur la dorsale ; pectorales brun rougeâtre à base sombre. Selles noires sur le dos du juvénile et du jeune adulte.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Lethrinidae / Empereurs

Monotaxis heterodon EMP

Empereur quatre raies blanches

Chez l'adulte (photo), haut du corps gris à brun rougeâtre ; bas du corps gris. ❶ Trois barres verticales blanches et étroites sur le corps, et une sur la tête derrière l'œil. ❷ Tache noire à la base des pectorales. ❸ Avant de la caudale jaune ; arrière rouge. Aspect similaire chez le juvénile et le jeune adulte mais barres verticales blanches et étroites plus prononcées.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Jan Messersmith, www.messersmith.name/wordpress

AYF *Aphareus furca*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau tidents



Haut du corps violet argenté, bas du corps gris bleuté argenté. 1 Nageoires jaunes à brun jaunâtre. 2 Derniers rayons de la dorsale et de l'anale prolongés en courts filaments.


Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

ARQ *Aphareus rutilans*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau rouillé



Haut du corps brun à lavande argenté, bas du corps argent. 1 Nageoires brun rougeâtre. 2 Derniers rayons de la dorsale et de l'anale prolongés en courts filaments.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AVR *Aprion virescens*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau job



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée gris verdâtre à reflets bleus à lavande. 1 Derniers rayons de la dorsale et de l'anale prolongés en courts filaments.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Lutjanus adetii LDW

Vivaneau de nuit

Haut du corps rose soutenu ; ventre plus clair. ❶ Rayure longitudinale jaune à jaune verdâtre le long du corps, des opercules à la caudale, et ❷ coloration jaune verdâtre autour de l'œil. ❸ Bandes roses sur la dorsale, les pelviennes et l'anale.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lutjanus argentimaculatus RES

Vivaneau des mangroves

Haut du corps bronze rougeâtre à brun olive, bas du corps rose argenté. ❶ Nageoires rouge foncé. ❷ Fortes canines sur les mâchoires. Le juvénile (pas de photo) a des barres verticales pâles sur le corps.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		




Lutjanus bohar LJB

Vivaneau chien rouge, anglais

Gros adulte (photo) rouge à gris rougeâtre. Le juvénile et le jeune adulte ont deux points blanc argenté sur le dos. ❶ Profond sillon allongé sur le museau entre les yeux et les narines. ❷ Nageoires rouge foncé virant au noir sur l'extérieur.

Longueur maximale : 80 cm LF


AS	**CK**	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	**NR**	**NU**	**PF**
PG	**PN**	**PW**	**SB**	**TK**	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		



SNA *Lutjanus boutton*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau des Moluques



Livrée rose à brun rougeâtre. Souvent, bas du corps orange jaunâtre. 1 Profonde encoche dans les opercules. Généralement dépourvu de marques distinctives mais, parfois, 10 à 12 rayures longitudinales jaunes sur les flancs. 2 Tache noire sur les flancs devant la partie antérieure de la dorsale souple.


Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SNA *Lutjanus carponotatus*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau drapeau



Sur fond gris à gris bleuté, 1 cinq à neuf rayures longitudinales jaunes à brun jaunâtre sur les flancs. 2 Nageoires jaune vif. 3 Tache noire bien visible sur la base des pectorales.


Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LWE *Lutjanus ehrenbergii*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau encrier



Ressemble à *Lutjanus fulviflamma* mais s'en distingue par la présence, sous la ligne latérale, de cinq bandes jaunes horizontales étroites de largeur inégale (bandes d'égale largeur chez *L. fulviflamma*).

Sur fond argenté à blanc argenté, 1 cinq rayures longitudinales jaunes de largeur inégale sous la ligne latérale. 2 Nageoires jaunes et 3 tache jaune à la base de la caudale. 4 Tache noire sur les flancs, généralement sous la ligne latérale.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Photo : CSIRO Australian National Fish Collection


Lutjanus fulviflamma LJF

Vivaneau gibelot

Sur fond argenté à blanc argenté, ❶ cinq à six rayures jaunes de largeur égale sous la ligne latérale. ❷ Nageoires jaunes et ❸ tache jaune à la base de la caudale. ❹ Tache noire sur les flancs, généralement sous la ligne latérale.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lutjanus fulvus LJV

Vivaneau queue noire

Haut du corps brun à gris jaunâtre et bas du corps jaune pâle. ❶ Bord des écailles jaune à brun formant parfois de fines rayures longitudinales sur les flancs. ❷ Caudale noire rougeâtre ; bord distal blanc. ❸ Pectorales, pelviennes et anale jaunes.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lutjanus gibbus LJG

Vivaneau pagaie

Corps gris rougeâtre à rouge. Les individus plus âgés ont du ❶ jaune sur les opercules, autour de la base des pectorales, des yeux et du museau. ❷ Front incurvé caractéristique et ❸ caudale rouge brique à lobes arrondis. ❹ Bords blancs sur la seconde dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 45 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



LVK *Lutjanus kasmira*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau à raies bleues



Haut du corps jaune, ventre plus pâle. 1 Quatre bandes longitudinales bleu électrique sur le haut du corps et 2 lignes horizontales fugaces sur le ventre.

Longueur maximale : 30 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Lutjanus quinquelineatus* mais possède quatre rayures longitudinales bleues sur le corps au lieu de cinq.

LJL *Lutjanus lutjanus*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau gros yeux



Haut du corps gris argenté, ventre argent. 1 Rayure longitudinale dominante jaune allant des yeux à la caudale. 2 Lignes jaunes obliques plus étroites au-dessus de la ligne latérale et lignes jaunes longitudinales et étroites sous la ligne latérale.

Longueur maximale : 33 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Lutjanus vitta* mais possède une rayure et des lignes jaunes et non brunes, et un moindre espacement entre les yeux et la mâchoire supérieure.

MAL *Lutjanus malabaricus*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau malabar



Adulte (photo) rouge rosé généralement dépourvu de marques. Juvénile rouge, parcouru d'une bande noire de la dorsale aux lèvres en passant par les yeux, et selle noire bordée de blanc à la base supérieure de la caudale.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Lutjanus monostigma LJK

Vivaneau églefin

Livrée jaune argenté à brun jaunâtre. ❶ Nageoires jaunes et ❷ tache noire sur la ligne latérale sous la partie antérieure de la dorsale souple (tache fugace voire absente chez l'adulte).

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lutjanus quinquelineatus LWQ

Vivaneau à cinq bandes

Haut du corps jaune et ventre plus pâle. ❶ Cinq rayures longitudinales bleu électrique prononcées sur le corps. Parfois, ❷ tache noire fugace sur l'arrière du corps.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Lutjanus kasmira* mais possède cinq rayures longitudinales bleues sur le corps au lieu de quatre.


Lutjanus rivulatus LUV

Vivaneau maori

Livrée vert grisâtre. ❶ Fines lignes sinueuses bleues sur la face et l'opercule. Chez l'adulte, ❷ écailles ornées d'un à trois minuscules points bleus créant un aspect tacheté.

Longueur maximale : 80 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



LUF *Lutjanus rufolineatus*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau lignes jaunes



Sur fond rouge rosé, 1 étroites rayures longitudinales jaunes sur les flancs. 2 Nageoires jaunes.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SNU *Lutjanus russellii*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau hublot



Ressemble à *Lutjanus monostigma* mais s'en distingue par sa caudale dont la base est beaucoup plus sombre.

Chez l'adulte, livrée blanc argenté à reflets roses. Dorsale et caudale grises, et 1 pelviennes et anale jaunes. Petit point noir à la base supérieure des pectorales. Souvent, 2 tache noire sur l'arrière. Chez le juvénile (photo), 3 cinq rayures longitudinales brunes sur la tête et le corps.


Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LUB *Lutjanus sebae*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau bourgeois



Chez l'adulte, livrée rouge rosé. Parfois, entrelacs de lignes jaunes sur la tête. Chez le jeune adulte (photo), livrée blanche à rouge pâle ; 1 bandes rouge foncé bien visibles en travers du corps et de la tête.

Longueur maximale : 110 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Lutjanus semicinctus SNA

Vivaneau rayures noires

Dos vert olive et ventre plus clair. ❶ Six à sept barres verticales sur le haut du corps. ❷ Grosse tache noire à la base de la caudale.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Lutjanus timoriensis LWT

Vivaneau de Timor

Chez l'adulte, livrée rouge avec une tache noire à la base des pectorales. Chez le juvénile (photo), ❶ bande sombre allant de l'avant de la dorsale jusqu'au museau (en traversant l'œil), et ❷ selle blanche sur le haut du pédoncule caudal.

Longueur maximale : 62 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Lutjanus vitta LUJ

Vivaneau à bande brune

Haut du corps gris rosé à gris jaunâtre, ventre blanc argenté. ❶ Rayure brune de l'œil à la caudale. ❷ Lignes brunes obliques plus étroites au-dessus de la ligne latérale et ❸ lignes longitudinales brunes sous la ligne latérale. ❹ Grande tache jaune sous la dorsale souple et sur la base de la caudale.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Lutjanus lutjanus* mais possède une rayure et des lignes brunes et non jaunes, et un plus grand espacement entre les yeux et la mâchoire supérieure.

SNX *Macolor macularis*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau minuit



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Haut du corps bleu gris foncé à brun-gris, ventre jaune et marques linéaires pâles sur les écailles.
1 Fines lignes sinueuses et points bleus sur la face et l'opercule.
2 Gros œil à l'iris jaune vif.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

MLN *Macolor niger*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau plat



Livrée grise à brun gris. 1 Agrégat de points sombres allongés et imbriqués. 2 Gros œil à l'iris doré opaque.


Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SJS *Symphorichthys spilurus*

Lutjanidae / Vivaneaux, lutjans

Vivaneau voilier



Chez l'adulte, 1 livrée brun jaunâtre à brun olive traversée de rayures longitudinales de la tête à la caudale. 2 Front abrupt caractéristique. 3 Tache noire sur le pédoncule caudal.
4 Dorsale souple pourvue de longs filaments.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Symphorus nematophorus SJE

Vivaneau diable

Chez le grand adulte, livrée marbrée rose et rouge. Chez le petit adulte (photo) et le juvénile, livrée généralement brun grisâtre ; ❶ nombreuses rayures longitudinales bleues. ❷ Profond sillon devant chaque œil. Parfois, ❸ pointe de la dorsale souple prolongée de longs filaments blancs.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	**FJ**	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		






Vivaneau minuit (*Macolor macularis*), Maldives. Photo : Malcolm Browne, Flickr

Megalops cyprinoides

Tarpon indo-pacifique



1 Livrée argentée ; écailles, œil et bouche de grande taille.
2 Pectorales basses sur le corps.
3 Dernier rayon de la dorsale prolongé en long filament.

Longueur maximale : 140 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Monodactylus argenteus


MOU

Lune d'argent

Compression latérale du corps caractéristique. ❶ Dorsale et anale triangulaires. Caudale et, souvent, dorsale jaunes.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		





Banc de lunes d'argent (*Monodactylus argenteus*). Photo : Richard Ling, www.bbmexplorer.com

MUL *Crenimugil crenilabis*

Mugilidae / Mulets

Mulet boxeur



Haut du corps gris olive argenté et ventre argent. 1 Petit point noir à la base des pectorales gris jaunâtre et 2 bord distal de la caudale sombre.


Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LZZ *Liza macrolepis*

Mugilidae / Mulets

Mulet à grandes écailles



Haut du corps gris à gris verdâtre. 1 Rayures longitudinales étroites et fugaces sur le corps. Souvent, barre jaune étroite à la base des pectorales.


Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

LZV *Liza vaigiensis*

Mugilidae / Mulets

Mulet mopiro



Haut du corps gris argenté; ventre argenté. 1 Grosses écailles en losange. 2 Pectorales à dominante noire. 3 Caudale gris jaunâtre de forme carrée.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Moolgarda seheli VMH

Mulet à tache bleue

Haut du corps gris argenté ; flancs et ventre argentés. ❶ Rayures horizontales étroites et sombres. ❷ Tache bleu foncé à noire sur la base supérieure des ❸ pectorales gris jaunâtre.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Mugil cephalus MUF

Mulet à grosse tête

Livrée argentée. Environ ❶ six rayures longitudinales foncées sur les flancs. Tête large et aplatie et corps trapu, avec ❷ une petite tache bleutée à la base des pectorales.

Longueur maximale : 70 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



MUV *Mulloidichthys flavolineatus*

Mullidae / Rougets-barbets

Capucin à bande jaune



Livrée blanc argenté. 1 Bande longitudinale jaune de la tête au pédoncule caudal. 2 Tache brun noirâtre dans la bande jaune sous la première dorsale.

Longueur maximale : 40 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Mulloidichthys vanicolensis* mais s'en distingue par la présence d'une tache brun noirâtre sur la bande jaune.

YJG *Mulloidichthys vanicolensis*

Mullidae / Rougets-barbets

Capucin de Vanicolo



Haut du corps rose à orange rougeâtre, ventre blanc à rose. 1 Rayure longitudinale jaune de l'œil au pédoncule caudal. 2 Nageoires jaunes.

Longueur maximale : 35 cm LF


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Mulloidichthys flavolineatus* mais s'en distingue par l'absence de tache brun noirâtre sur la bande jaune.

RPX *Parupeneus barberinoides*

Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet bicolore



Tête et avant du corps brun rougeâtre. 1 Deux bandes blanches. 2 Arrière du corps blanc et jaune, avec 3 une tache sombre sous la seconde dorsale.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Parupeneus barberinus RFP

Rouget-barbet barberin

Livrée blanche à gris pâle. ❶ Rayure brun rougeâtre à noire allant du museau sous la seconde dorsale (et traversant l'œil). Souvent, livrée jaune à gris jaunâtre sur le dos, au-dessus de la rayure. ❷ Grosse tache noire sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Parupeneus macronemua* (pas de photo) mais s'en distingue par l'absence de bande noire longeant la base de la seconde dorsale.


Parupeneus ciliatus QZI

Rouget-barbet lignes blanches

Livrée vert jaunâtre à rouge clair ou violet. ❶ Deux ou trois rayures blanches sur la tête et l'avant du corps (peu visibles sur la photo). ❷ Tache blanche oblongue sur la partie antérieure du pédoncule caudal.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Parupeneus crassilabris RPX

Rouget-barbet lèvres épaisses

Livrée grise à gris bleuté ou violet, parfois brun rougeâtre. ❶ Tache noire sous l'œil et ❷ deux barres verticales noires sur le corps, sous chaque dorsale. ❸ Écailles à bord gris jaunâtre ou ornées d'une tache orange jaunâtre.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Parupeneus insularis* mais fréquente les eaux du Pacifique occidental et non celles du Pacifique oriental et central.

RPY *Parupeneus cyclostomus*

Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet selle jaune



De couleur très variable, allant du brun clair au violet ou au jaune vif, et toutes les nuances intermédiaires. Possède souvent 1 des veinures bleues autour des yeux et 2 une selle jaune derrière la seconde dorsale.


Longueur maximale : 45 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

RQF *Parupeneus heptacanthus*

Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet cinnabare



Haut du corps gris jaunâtre à gris rosé ; ventre blanc rosé ou bleuté. 1 Rayures lavande à bleues autour des yeux et sur le haut des flancs. 2 Petite tache brun rouge sur les flancs.


Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

RFQ *Parupeneus indicus*

Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet indien



Livrée grise ou brune à blanc bleuté. 1 Tache jaune vif sur le corps. 2 Gros point noir sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Mullidae / Rougets-barbets


Parupeneus insularis RPX

Rouget-barbet deux selles

Livrée grise à gris bleuté ou violette, parfois brun rougeâtre. ❶ Marque noire autour de l'œil et ❷ deux barres noires sur le corps, une sous chaque dorsale. ❸ Écailles à bord gris jaunâtre ou ornée d'une tache orange jaunâtre.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Parupeneus crassilabris* mais fréquente les eaux du Pacifique oriental et central et non celles du Pacifique occidental.

Mullidae / Rougets-barbets


Parupeneus multifasciatus RPK

Rouget-barbet trois selles

Livrée gris clair à rouge rosé avec une alternance de barres verticales ❶ brun rougeâtre et ❷ blanches, de largeur variable (peu visibles sur l'image). ❸ Trait horizontal sombre derrière l'œil.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Mullidae / Rougets-barbets


Parupeneus pleurostigma RPL

Rouget-barbet pastille

Livrée gris rosé à gris jaunâtre. ❶ Tache rose pâle à blanche derrière un ❷ gros point sombre situé sous la partie postérieure de la première dorsale. ❸ Courtes lignes bleues rayonnant à partir des yeux, sauf sur le pourtour inférieur.


Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



GOX *Upeneus taeniopterus* — Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet rayé




Haut du corps bronze, ventre blanc argenté. 1 Rayure longitudinale orange allant de l'œil au haut du pédoncule caudal, et 2 rayure jaune plus étroite allant au moins des pectorales jusqu'au bas du pédoncule caudal. 3 Six à sept barres noir rougeâtre sur le lobe supérieur de la caudale.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

UPI *Upeneus vittatus* — Mullidae / Rougets-barbets

Rouget-barbet lignes d'or



Livrée argentée aux tons jaunes et verts. 1 Quatre rayures longitudinales brun jaunâtre sur le corps. 2 Première dorsale munie d'une large pointe noire précédée de deux bandes brun jaunâtre. 3 Cinq bandes brun foncé sur le lobe supérieur de la caudale ; 4 trois sur le lobe inférieur. Rayure située vers la pointe du lobe inf. deux fois plus large que les autres.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Gymnothorax fimbriatus AXZ

Murène frangée

Livrée brun gris pale. Motifs très variables composés de ❶ taches brun foncé nettement séparées. ❷ Bord des nageoires pâle.

Longueur maximale : 80 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Gymnothorax flavimarginatus AMG

Murène points jaunes

Corps jaune pâle ❶ densément marbré de brun foncé. ❷ Museau et avant de la mâchoire inférieure brun violacé. ❸ Tache noire sur les ouvertures branchiales.

Longueur maximale : 150 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Gymnothorax javanicus AXZ

Murène javanaise


Livrée brune. ❶ Marbrures brun foncé et ❷ nombreux petits points brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❸ Tache noire sur les ouvertures branchiales.

Longueur maximale : 250 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Barbure à six doigts



Ressemble à *Polydactylus plebeius* (pas de photo) mais la caudale comporte six rayons allongés (au lieu de cinq chez *P. plebeius*).

Livrée argentée. 1 Museau arrondi et 2 rayures noir brunâtre étroites sur le corps. Six rayons inférieurs des pectorales séparés et allongés.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Beauclaire de roche (*Heteropriacanthus cruentatus*), Taveuni (Fidji). Photo : Pauline Bosserelle

Priacanthidae / Beauclaires

Heteropriacanthus cruentatus HTU

Beauclaire de roche

Livrée variable de rouge à argentée. ❶ Nageoires parsemées de points sombres fugaces, surtout visibles sur la caudale. ❷ Caudale légèrement arrondie.

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *Priacanthus blochii* mais s'en distingue par la présence de points sombres sur les nageoires et l'absence de points le long de la ligne latérale.

Priacanthidae / Beauclaires


Priacanthus blochii QDC

Beauclaire de Bloch

Livrée rouge à argentée avec des taches rouges. En général, ❶ quinze petits points sombres le long de la ligne latérale. ❷ Nageoires généralement unies, sans points ni taches. ❸ Caudale arrondie.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Heteropriacanthus cruentatus* mais s'en distingue par l'absence de points sur les nageoires.

Priacanthidae / Beauclaires


Priacanthus hamrur BWH

Beauclaire miroir

Livrée généralement rouge vif mais parfois argentée avec des barres verticales rouges. ❶ Série de petits points sombres sur la ligne latérale. ❷ Caudale en croissant.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




BMK *Bolbometopon muricatum*

Scaridae / Perroquets

Perroquet bossu vert



Adulte



Juvénile

Chez l'adulte, livrée gris verdâtre.
1 Bosse caractéristique sur le front.
Chez le juvénile, livrée brune à verte avec 2 cinq rangées verticales de points blancs.

Longueur maximale : 120 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


ULG *Calotomus carolinus*

Scaridae / Perroquets

Perroquet des Carolines



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, livrée verte à rouge brunâtre, avec 1 de nombreuses barres rose orangé rayonnant à partir des yeux.
En phase initiale, livrée brune marbrée avec 2 des taches pâles sur le dos.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Cetoscarus ocellatus PWT

Perroquet bicolore


En phase terminale, livrée verte avec ❶ de nombreux petits points et lignes rose orangé sur la tête et l'avant du corps, et de courtes barres rose orangé sur les écailles vers la moitié postérieure du corps. ❷ Rayure longitudinale rose orangé de la lèvre supérieure à l'anale ; pas de tache sous cette ligne.
En phase initiale, tête brun violacé à rougeâtre ; ❸ œil à l'iris doré. ❹ Bande bleu pâle sur le dos et ❺ marques gris verdâtre à gris bleuté sur les écailles des flancs et du ventre.

Longueur maximale : 80 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale

Espèce autrefois prise pour *Cetoscarus bicolor* dans toute son aire de répartition. Des analyses génétiques récentes ont démontré l'existence de deux espèces distinctes : *C. bicolor* en mer Rouge et *C. ocellatus* dans la région Indo-Pacifique.


Chlorurus bleekeri UUP

Perroquet joue blanche


En phase terminale, livrée verte ; ❶ écailles roses à lavande ; ❷ grosse tache jaune bordée de vert sur les joues.
En phase initiale, livrée brun foncé ; généralement, ❸ trois à quatre barres verticales pâles sur le dos jusqu'aux flancs (peu visibles sur la photo).

Longueur maximale : 49 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale




Phase initiale


UUV *Chlorurus frontalis*

Scaridae / Perroquets

Perroquet tatoué



Phase terminale



Phase intiale

En phases terminale et initiale, livrée verte avec 1 des marques brun clair à rose pâle sur le haut de la tête et 2 un trait vertical rose pâle sur chaque écaille.
En phase terminale, front abrupt et lobes de la caudale allongés.


Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

PWT *Chlorurus japanensis*

Scaridae / Perroquets

Perroquet japonais



Phase terminale



Phase intiale

En phase terminale, livrée jaune verdâtre clair ; large bande violette du front au ventre. 1 Écailles ornées d'un trait vertical rose 2 se réduisant à un point vers la caudale. 3 Trois bandes bleu-vert se prolongeant derrière l'œil, et deux bandes devant les yeux.
En phase initiale, livrée brune ; 4 caudale orange rougeâtre bordée 5 d'un liseré noir étroit.

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Chlorurus microrhinos PWT

Perroquet bleu

En phases terminale et initiale, livrée verte à vert bleuté ; ❶ front abrupt et bulbeux caractéristique. Tête violet bleuté foncé, avec une ❷ bande verte irrégulière sur les joues. Variante rouge pourvue de nageoires jaunes parfois observée. Juvénile brun foncé à noir avec ❸ trois à quatre rayures jaune pâle sur la tête et le corps.


Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale

Photo phase terminale : Brad Moore, SPC



Phase juvénile


Chlorurus spilurus PWT

Perroquet brûlé


En phase terminale, livrée verte ; ❶ joues jaune pâle, ❷ bord des écailles lavande, et ❸ pédoncule caudal pâle et caudale carrée. En phase initiale, livrée brun rougeâtre clair avec ❹ trois à quatre rangées de points blancs sur l'arrière du corps et, souvent, ❺ une grosse tache à la base de la caudale.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale




Phase intiale

Espèce autrefois prise pour *Chlorurus sordidus* dans toute son aire de répartition. Des analyses génétiques récentes ont démontré l'existence de deux espèces distinctes : *C. sordidus* en mer Rouge et *C. spilurus* dans le Pacifique.

HJZ *Hipposcarus longiceps*

Scaridae / Perroquets

Perroquet long museau



Phase terminale



Phase initiale

Photo phase initiale : Brad Moore, SPC

En phase terminale, livrée bleu-vert pâle ; 1 bord des écailles rose pâle.
En phase initiale, livrée gris jaunâtre pâle ; 2 caudale jaune.


Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


LOV *Leptoscarus vaigiensis*

Scaridae / Perroquets

Perroquet marbré



Phase terminale



Phase initiale

Livrée vert olive à brun verdâtre.
1 En phase terminale, nombreux petits points bleus sur la tête, le corps, l'anale et la caudale et, souvent, 2 rayure blanche longitudinale sur le corps.
En phase initiale, livrée analogue hormis 3 deux à trois rangées longitudinales de taches très espacées et nombreux points plus petits sur le corps.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Scarus altipinnis USX

Perroquet haute épine


En phase terminale, livrée verte ; 1 bord des écailles rose ; 2 bandes vert foncé autour de la bouche, et 3 filaments courts caractéristiques à mi-dorsale (seul perroquet à présenter cette particularité).
En phase initiale, livrée brun-rouge ; bord des écailles sombre ; 4 bandes vert foncé autour de la bouche ; 5 filaments caractéristiques à mi-dorsale et, souvent, quelques petits points blancs sur le corps.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale


Scarus chameleon USX

Perroquet caméléon

En phase terminale, livrée bleu-vert ; 1 bord des écailles lavande et 2 grande zone rose orangé derrière les pectorales. Bande verte étroite autour de la bouche et 3 bande vert foncé entre les yeux, sur le haut de la tête.
En phase initiale, livrée brun olive, souvent fortement contrastée par un ventre blanc.

Longueur maximale : 31 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale




Phase initiale


USX *Scarus dimidiatus*

Scaridae / Perroquets

Perroquet moitié



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, tête vert uni au-dessus et à l'arrière de l'œil, et 1 barre jaune bordée de vert sur l'opercule, de l'œil jusqu'aux pectorales. Arrière du corps vert avec 2 des écailles bordées de rose lavande.
En phase initiale, livrée vert jaunâtre ; tête grise et 3 trois à quatre barres verticales sombres sur le dos.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


USX *Scarus flavipectoralis*

Scaridae / Perroquets

Perroquet pectorales jaunes



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, tête et avant du corps brun clair ; arrière bleu-vert plus foncé. 1 Bande verte du museau à l'arrière de l'opercule. Les gros individus ont souvent une tache jaune sur le pédoncule caudal.
En phase initiale, livrée jaune pâle à gris rougeâtre ; 2 rayures blanches fugaces sur l'abdomen et 3 pectorales jaune vif.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Scarus forsteni USF

Perroquet de Forsten


En phase terminale, livrée verte ; ❶ bord des écailles rose et ❷ large bande verte autour de la bouche.
En phase initiale, haut du corps brun rougeâtre à gris rougeâtre, ventre plus pâle ; ❸ bande longitudinale foncée de l'œil au pédoncule caudal. ❹ Dans cette bande, zone iridescente bleu-vert, juste derrière les pectorales.

Longueur maximale : 55 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale

Scarus frenatus USZ

Perroquet à six bandes


En phase terminale, tonalités de vert et marques rose orangé sur les écailles. ❶ Arrière du corps et pédoncule caudal vert pâle caractéristiques. ❷ Lèvre supérieure rose.
En phase initiale, livrée jaune brunâtre à gris rougeâtre ; ❸ nombreuses rayures longitudinales sombres sur le corps (parfois disjointes en losanges).

Longueur maximale : 47 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale


USY *Scarus ghobban*

Scaridae / Perroquets

Perroquet barbe bleue



Phase terminale



Phase initiale

Photo phase initiale : Brad Moore, SPC

En phase terminale, livrée brun clair ; écailles marquées de bleu-vert et 1 deux bandes bleues sur le menton. Souvent, zone rose orangé au-dessus et à l'arrière des pectorales.
En phase initiale, livrée brun jaunâtre avec 2 quatre à cinq barres verticales bleues de forme irrégulière sur le dos et les flancs. 3 Barres bleues autour de la bouche et des yeux.


Longueur maximale : 75 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


USX *Scarus globiceps*

Scaridae / Perroquets

Perroquet à tête ronde



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, livrée verte et 1 bord des écailles rose ; 2 lignes discontinues lavande sur le haut de la tête, et deux à trois rayures violet rosâtre sur le ventre.
En phase initiale, livrée brun grisâtre avec 3 trois fines rayures longitudinales sur le ventre.

Longueur maximale : 45 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Scarus longipinnis USX

Perroquet haute dorsale


En phase terminale, livrée orange brunâtre à violette ; ❶ bande longitudinale verte allant des yeux aux pectorales et trois bandes longitudinales bleu-vert sur le ventre. ❷ Dorsale haute et arrondie caractéristique.
Phase initiale brun orange avec souvent, ❸ barres brun foncé sur les flancs et ❹ grande zone noire sur la caudale.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale

Scarus niger UVN

Perroquet dorade

En phase terminale, livrée vert foncé ; bord des écailles brun rougeâtre à violet ; ❶ tache ou trait jaune à vert derrière l'œil (présente souvent l'apparence d'une petite tache jaune sur le bord de l'opercule). ❷ Bandes vertes autour des lèvres ; autre bande verte sur le menton se poursuivant souvent jusqu'à l'œil. ❸ Pectorales rouge violacé.
En phase initiale, tête et nageoires rouges (sauf la caudale) et ❹ bandes longitudinales sinueuses noires et blanches sur le corps.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale




Phase initiale

USX *Scarus oviceps*

Scaridae / Perroquets

Perroquet casqué



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, livrée bleu-vert ; 1 liséré rose sur les écailles et 2 tête et avant du corps plus foncés (formant un « casque »). 3 Zones vert clair et vert foncé caractéristiques sur les pectorales. En phase initiale, livrée gris clair à reflets jaunes et 4 « casque » gris foncé caractéristique sur le haut de la tête et l'avant du corps.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


USX *Scarus prasiognathos*

Scaridae / Perroquets

Perroquet joues vertes



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, 1 livrée vert foncé ; haut de la tête jaune verdâtre. 2 Larges taches turquoise caractéristiques sur le menton, les joues, la gorge et en travers du museau.
En phase initiale, livrée brun rougeâtre et 3 taches blanches éparses sur le corps.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

En phase initiale, ressemble à *S. altipinnis* mais ne possède pas d'épine filamenteuse à mi-dorsale.

Scarus psittacus UVD

Perroquet commun

En phase terminale, livrée verte à l'arrière du corps, virant au rose vers la tête. ❶ Museau lavande et ❷ bord des écailles rose. ❸ Bandes vertes sur le contour des lèvres, se rejoignant à la commissure pour se poursuivre sous l'œil. ❹ Deux autres lignes vertes derrière l'œil.
En phase initiale, livrée brun rougeâtre avec un mu-seau pâle.

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale

Scarus quoyi USX

Perroquet de Quoy

En phase terminale (photo), livrée verte à vert rosé ou grise ; ❶ « moustache » et joues vertes ; ❷ zone vert lime sur le haut du pédoncule caudal.
En phase initiale, dos gris et bas du corps brun rougeâtre. Quatre larges barres brunes alternées d'étroites barres jaunes à mi-corps et sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale


USX *Scarus rivulatus*

Scaridae / Perroquets

Perroquet labyrinthe



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, livrée verte à bleu-vert ; 1 tache orange caractéristique sur l'opercule ; 2 nombreuses lignes sinueuses vertes sur la tête. 3 Pectorales vert vif.
En phase initiale, livrée grise à gris-brun avec 4 deux rayures longitudinales pâles sur le corps.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

UVE *Scarus rubroviolaceus*

Scaridae / Perroquets

Perroquet braisé



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, tons verts ; 1 front bulbeux, 2 bande verte à bleue au-dessus de la lèvre supérieure bordée de rose et 3 double bande sur le menton.
En phase initiale, livrée rouge à brun rougeâtre ; 4 marques sombres sur les écailles.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Scarus schlegeli USX

Perroquet de Schlegel


En phase terminale, livrée vert foncé à violet bleuté ; front plus clair et ❶ courte barre verticale jaune sur le dos (palissant vers le ventre).
En phase initiale, livrée brun grisâtre ; ❷ cinq à six barres verticales blanches sur le corps.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale

Scarus spinus USX

Perroquet museau vert


En phase terminale, livrée bleu-vert ; ❶ museau vert arrondi caractéristique et ❷ tache jaune sur la joue et l'opercule.
En phase initiale, livrée brune à brun foncé ; ❸ quatre barres verticales pales et fugaces sur le corps (se présentent parfois comme des rangées de taches verticales).

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Phase terminale



Phase initiale


UVH *Scarus tricolor*

Scaridae / Perroquets

Perroquet tricolore



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, tons vert-jaune à vert ; base des écailles lavande et 1 élongation caractéristique des lobes de la caudale. En phase initiale, tête gris foncé ; alternance de brun, jaune, bleu et rouge clair sur les flancs (peu visible sur la photo). 2 Anale orange jaunâtre et 3 caudale rouge.


Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


USX *Scarus xanthopleura*

Scaridae / Perroquets

Perroquet rouge



Phase terminale



Phase initiale

En phase terminale, livrée verte ; 1 bord des écailles rose, 2 tache vert foncé irrégulière sur le bas de la joue et le menton. En phase initiale, 3 livrée rouge vif à gris rougeâtre avec trois à quatre barres verticales pâles sur les flancs.

Longueur maximale : 55 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Acanthocybium solandri WAH

Thazard-bâtard

Corps argenté longiligne ;
1 museau pointu et allongé, et
2 pinnules dorsales et anales.
Souvent, 3 barres sur les flancs.

Longueur maximale : 210 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection


Euthynnus affinis KAW

Thonine orientale, bonite à dos rayé

Corps argenté fusiforme. 1 Lignes sinueuses sombres sur le dos, au-dessus de la ligne latérale.
2 Points noirs sur le ventre, sous les pectorales.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Grammatorcynus bilineatus DBM

Thazard-kusara

Corps argenté mince ; 1 deux lignes latérales (l'une sur le flanc supérieur, l'autre sur le flanc inférieur), et 2 pinnules dorsales et anales. Nette séparation entre les deux dorsales.

Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		





Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

DOT *Gymnosarda unicolor*

Scombridae / Thons, thazards

Bonite à gros yeux, thon dents de chien



Corps long et trapu pourvu de pinnules dorsales et anales. Haut du corps bleu-gris ; ventre argenté. 1 Mâchoire prononcée et dents saillantes. 2 Extrémité de la seconde dorsale et de l'anale blanche.


Longueur maximale : 250 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SKJ *Katsuwonus pelamis*

Scombridae / Thons, thazards

Listao, bonite



Haut du corps violet argenté foncé, ventre argenté. 1 Trois à six bandes longitudinales foncées sur le ventre.


Longueur maximale : 100 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

RAG *Rastrelliger kanagurta*

Scombridae / Thons, thazards

Maquereau des Indes



Livrée argentée avec des points fugaces sur le haut du dos. 1 Deux à trois rayures longitudinales étroites jaunes sur les flancs. 2 Tache noire bien visible sous les pectorales.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Scombridae / Thons, thazards


Scomberomorus commerson COM

Thazard rayé indo-pacifique

Haut du corps gris bleuté ; ventre argent. ❶ Pinnules dorsales et anales et ❷ nombreuses barres étroites et foncées, de forme irrégulière. ❸ Extrémité de la seconde dorsale et l'anale blanche.

Longueur maximale : 180 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Scombridae / Thons, thazards

Thunnus albacares YFT

Albacore

Adulte fusiforme ; haut du corps noir métallique à bleu foncé, ventre jaune à argent. ❶ Seconde dorsale et anale jaunes, allongées de manière caractéristique. Juvénile : ❷ barres verticales courbes, rapprochées et régulièrement espacées, séparées par des rangées de petites taches sur le bas du corps.

Longueur maximale : 210 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Le juvénile ressemble à *Thunnus obesus* mais s'en distingue par la présence de barres verticales rapprochées et régulièrement espacées sur le bas du corps (chez *T. obesus*, les barres sont larges et irrégulièrement espacées).

Scombridae / Thons, thazards

Thunnus obesus BET

Thon obèse

Adulte fusiforme ; haut du corps noir métallique à bleu foncé, ventre jaune à blanc argenté. ❶ Pinnules dorsales et anales jaune vif bordées de noir. Juvénile : ❷ barres verticales larges et irrégulièrement espacées sur le bas du corps.

Longueur maximale : 220 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : S. Chow, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, Japan

EHG *Aethaloperca rogaa*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille roga



Livrée brun foncé à noire. Souvent, 1 barre pale sur toute la largeur de l'abdomen et, parfois, marques orange peu visibles. 2 Intérieur de la bouche rouge.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AYG *Anyperodon leucogrammicus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou élégant




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée gris verdâtre à gris brunâtre ; 1 points ambre doré sur la tête, le corps et la dorsale de l'adulte. 2 Rayures longitudinales pâles caractéristiques allant du museau à la caudale.


Longueur maximale : 65 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFF *Cephalopholis argus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille la prude



Livrée brune à mauve. 1 Petits points bleus à mauves cernés de noir sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Larges barres verticales pâles sur l'arrière du corps.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Cephalopholis boenak CVK

Vieille chocolat

Livrée brun clair. Environ ❶ sept à huit barres verticales brun foncé sur les flancs. ❷ Angles de la caudale sombres, frangés de bleu clair (peu visible sur la photo).

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	**WF**	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Cephalopholis cyanostigma CFY

Vieille étoiles bleues

Livrée brun rougeâtre. ❶ Points bleus cernés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Dorsale molle, anale et caudale frangées de bleu pâle. ❸ Pectorales et pelviennes orange.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Cephalopholis formosa IIX

Vieille lignes bleues

Livrée brun foncé à brun jaunâtre ; ❶ nombreuses lignes bleues étroites sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



UKR *Cephalopholis leopardus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille léopard



Livrée brun rougeâtre marbrée. 1 Nombreux points orange rougeâtre sur la tête et le corps. 2 Point brun foncé sur le bord supérieur de l'opercule et 3 selle sombre sur le pédoncule caudal. 4 Trait sombre sous la marge supérieure de la caudale.


Longueur maximale : 25 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFI *Cephalopholis miniata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille de corail



Livrée rouge-orange à brun rougeâtre. 1 Points bleus cernés de noir sur la tête, le corps et les nageoires, sauf les pectorales et les pelviennes. 2 Liseré bleu sur toutes les nageoires sauf 3 les pectorales, bordées de jaune.


Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFX *Cephalopholis sexmaculata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille six taches



Livrée rouge-orange. 1 Petits points bleus sur la tête, le corps et les nageoires dorsale, anale et caudale. Souvent, 2 courtes lignes bleues sur la tête. 3 Selles noires alternées de barres verticales plus pâles sur le corps.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Cephalopholis sonnerati EFT

Vieille ananas

Livrée rouge-orange à brun rougeâtre ; ❶ nombreux petits points brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. Parfois, ❷ tache rouge foncé sur le bord supérieur de l'opercule.

Longueur maximale : 57 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Cephalopholis spiloparaea CWR

Vieille fraise

Livrée rouge à orange rougeâtre. ❶ Marbrures rouge foncé à brun rougeâtre. ❷ Marge de la caudale bleu pâle à blanche.

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Cephalopholis urodeta CWU

Vieille aile noire

Livrée rouge à brun rougeâtre. Parfois, barres verticales pâles fugaces sur le corps. ❶ Lignes obliques blanches caractéristiques sur la caudale.

Longueur maximale : 28 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



MPV *Cromileptes altivelis*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bossu




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée blanc vert à brun verdâtre clair. 1 Gros points noirs épars sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Front concave caractéristique.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	**FJ**	FM	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

EPR *Epinephelus areolatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou aréolé



Livrée gris blanchâtre. 1 Gros points bruns à or nombreux et denses sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale légèrement concave ; bord postérieur blanc.

Longueur maximale : 45 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	WS		

EFH *Epinephelus chlorostigma*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou pintade



Livrée aux tons bruns. 1 Nombreux petits points brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale légèrement concave ; bord postérieur blanc.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	**KI**
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Epinephelus coeruleopunctatus EWC

Mérou taches blanches

Livrée gris brunâtre, ornée de ❶ nombreux petits points blancs à gris blanchâtre et de ❷ taches blanches éparses de plus grande taille. ❸ Pectorales, anale et caudale sombres sans tache.

Longueur maximale : 76 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	**KI**
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus coioides ENI

Mérou taches orange

Haut du corps brun grisâtre clair, ventre brun blanchâtre. ❶ Cinq bandes verticales brun grisâtre sur le corps, et ❷ nombreux points ambre doré sur la tête, le corps et la base des nageoires.

Longueur maximale : 100 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	**WS**		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Epinephelus corallicola GPX

Mérou corail

Livrée blanc sale à brun pâle. ❶ Nombreux petits points noirs très espacés sur la tête, le corps et les nageoires et ❷ selles sombres sur le dos.

Longueur maximale : 50 cm LT


AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



EPY *Epinephelus cyanopodus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bleu



Livrée gris bleuté pâle. ❶ Nombreux petits points noirs, et points noirs plus gros, de forme irrégulière, sur la tête, le corps et les nageoires. Généralement, ❷ marge intérieure noire sur la caudale (peu visible sur la photo). ❸ Extrémité des pelviennes noire.


Longueur maximale : 122 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEA *Epinephelus fasciatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou oriflamme



Livrée très variable, allant du gris verdâtre au rouge jaunâtre ou au brun rougeâtre. ❶ Cinq barres fugaces brun orangé à rouge foncé sur le corps. ❷ Crête triangulaire des membranes de la dorsale épineuse souvent noires ou rouge vif.

Longueur maximale : 40 cm LT


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Epinephelus retouti* mais possède des pointes noires sur certains rayons de la dorsale épineuse.

EWF *Epinephelus fuscoguttatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou marron



Livrée mordorée à brun clair. ❶ Taches brun foncé irrégulières, et ❷ petits points brun foncé nombreux et denses sur la tête, le corps et les nageoires. ❸ Profil fortement indenté au-dessus des yeux. ❹ Petite tache noire en forme de selle sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 120 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Epinephelus polyphekadion* mais s'en distingue par son front fortement indenté au-dessus des yeux.

Epinephelus hexagonatus EEX

Mérou mélifère

Sur fond blanc à brun clair, ❶ nombreuses taches hexagonales brunes à brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Cinq groupes de taches noires en forme de selle sur le dos. ❸ Se distingue par une tache jaune-brun derrière l'œil et une grande tache oblongue de même couleur sur l'opercule (parfois reliées entre elles).

Longueur maximale : 27 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection


Epinephelus howlandi GPX

Mérou sellé noir

Livrée gris pâle à gris brunâtre. ❶ Points brun foncé à noirs sur la tête, le corps et les nageoires (sauf pectorales, parfois). ❷ Tache brun foncé à quasi noire sur le dos, et autre tache sur le pédoncule caudal. ❸ Liseré blanc sur la dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 55 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Epinephelus lanceolatus EEN

Mérou lancéolé

Chez l'adulte, livrée brun-gris marbrée. ❶ Taches blanches irrégulières éparses et ❷ nombreux petits points noirs. Juvénile (pas de photo) jaune avec des barres verticales irrégulières noires.

Longueur maximale : 270 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		





Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

EEM *Epinephelus macrospilos*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou tapis



Livrée blanc sale à gris-brun pâle. 1 Nombreuses taches réticulées brunes sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Liseré ivoire sur la dorsale, l'anale et la caudale.


Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEC *Epinephelus maculatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou haute voile



Sur fond brun clair, 1 nombreux points brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Deux selles pâles bien visibles sur le front et à mi-dos. 3 Reflets jaunes sur les nageoires (plus marqués chez le juvénile). 4 Dorsale relativement haute.


Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

MAR *Epinephelus malabaricus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou malabar



Livrée gris clair à brun jaunâtre. 1 Cinq larges barres verticales brun foncé et 2 nombreux points et taches pâles sur la tête et le corps. 3 Nombreux petits points noirs, nettement différenciés, sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 234 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Epinephelus melanostigma EZP

Mérou dossard

Livrée gris blanchâtre à gris bleuté. ❶ Taches réticulées brun orangé nombreuses et denses sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégat de taches formant une selle noire sous le milieu de la dorsale.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches


Epinephelus merra EER

Mérou gâteau de cire

Sur fond blanc à brun clair, ❶ nombreuses tache rondes à réticulées brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégat de taches formant de courtes bandes.

Longueur maximale : 32 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus miliaris EWM

Mérou abeille

Livrée blanche. ❶ Taches grises à brunes, et taches brunes réticulées nombreuses et denses sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 53 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Jan Messersmith, Flickr

GPX *Epinephelus ongus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou flocons



Livrée brune. 1 Grosses taches blanches et nombreux petits points pâles sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Agrégat de points formant des lignes sinueuses sur les individus de plus grande taille.


Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEK *Epinephelus polyphekadion*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou camouflage



Ressemble à *Epinephelus fuscoguttatus* mais s'en distingue par un front plat au dessus des yeux.

Livrée brun clair. 1 Taches brunes de forme irrégulière sur la tête et le corps, couvertes de nombreux petits points brun foncé rapprochés sur la tête, le corps et toutes les nageoires. 2 Petite selle noire sur le pédoncule caudal.


Longueur maximale : 90 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EWR *Epinephelus retouti*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou à bout rouge



Ressemble à *Epinephelus fasciatus* mais s'en distingue par l'extrémité rouge de ses épines dorsales.

Livrée orange jaunâtre à rouge brunâtre. Généralement, 1 cinq barres verticales fugaces sur le corps. 2 Dorsale souple et partie supérieure de la caudale gris-brun. 3 Extrémité des épines dorsales rouge.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Epinephelus socialis GPX

Mérou des platiers

Tête et corps blancs à brun clair. ❶ Petits points brun-noir nombreux et denses. ❷ Dorsale, anale et caudale couvertes de points blancs et avec un ❸ liseré blanc précédé d'une bande noire.

Longueur maximale : 52 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Epinephelus spilotoceps EZO

Mérou quatre selles

Sur fond brun blanchâtre, ❶ nombreuses taches réticulées brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégats de points formant quatre selles foncées sur le dos.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Epinephelus tauvina EPT

Mérou loutre

Haut du corps brun pâle ; ventre blanc sale. ❶ Points brun rougeâtre à brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Cinq selles sombres fugaces sur le dos. ❸ Séries de points noirs formant une marge foncée sur la dorsale molle, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 75 cm LT


AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



GCA *Gracila albomarginata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bord rouge



Livrée gris verdâtre à gris brunâtre ou brun orangé. 1 Nombreuses barres courtes et étroites, brun foncé à orange-brun sur les flancs. 2 Grand carré blanc à mi-corps et 3 point noir sur le pédoncule caudal blanc (peu visibles sur la photo). 4 Lignes bleues étroites sur la tête.


Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EME *Plectropomus areolatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou queue carrée



Livrée gris blanchâtre à brun clair. 1 Nombreux petits points bleus bordés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale carrée caractéristique marquée d'un 3 liseré blanc précédé d'une bande sombre.


Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EML *Plectropomus laevis*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou sellé (foncé)



Variante foncée : livrée grise à brun olive. 1 Trois à quatre barres ou selles sombres. 2 petits points bleus sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		


Plectropomus laevis EML

Mérou sellé (clair)

Variante claire : livrée blanche. ❶ Quatre selles brun foncé à noires sur le corps. ❷ Bande noire au-dessus de l'œil et ❸ nageoires jaunes.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Plectropomus leopardus EMO

Saumonée léopard

Livrée rouge ou gris pâle à brun. ❶ Nombreux points bleus bordés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires, hormis les pectorales. ❷ Cercle bleu quasi complet autour de l'œil.

Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Plectropomus maculatus* mais s'en distingue par des points bleus, au lieu de courtes barres, sur la tête.

Plectropomus maculatus PLM

Vieille Saint-Silac

Livrée rouge ou gris pâle à brune avec de courtes barres bleues sur la tête et ❶ de nombreux petits points bleus sur le corps et les nageoires, hormis les pectorales. ❷ Liseré bleu sur la caudale.

Longueur maximale : 125 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *Plectropomus leopardus* mais s'en distingue par de courtes barres bleues, au lieu de points, sur la tête.

EMW *Plectropomus oligacanthus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou-loche cacatois




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée brun rougeâtre. 1 Lignes bleues sur la tête. 2 Points bleus sur le corps et les nageoires, dont certains s'unissent pour former des barres verticales à mi-corps.


Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		

VRA *Variola albimarginata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Croissant queue blanche



Livrée orange brunâtre. 1 Points rouges à violets sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale en croissant bordé d'un fin liseré blanc.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	**NU**	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	**WS**		

Ressemble à *Variola louti* mais possède un fin liseré blanc sur la caudale.

VRL *Variola louti*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Croissant queue jaune



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée rouge-orange à brun rougeâtre. 1 Nombreux petits points ou traits bleus, violets, lavande ou roses sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Marge postérieure des nageoires jaune. 3 Caudale en croissant caractéristique.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	NR	**NU**	**PF**
PG	**PN**	**PW**	**SB**	**TK**	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

Ressemble à *Variola albimarginata* mais possède une marge jaune à l'arrière des nageoires.

Siganidae / Sigans


Siganus argenteus IGA

Sigan gris

Livrée bleu clair à gris bleuté. ❶ Nombreux petits points et lignes jaunes sur la tête et le corps. ❷ Courte barre verticale sombre sur le bord supérieur de l'opercule. ❸ Caudale fourchue caractéristique.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Siganidae / Sigans


Siganus canaliculatus SCN

Sigan pintade

Livrée gris argenté à brun jaunâtre/verdâtre. ❶ Nombreux points blanc bleuté sur la tête et le corps. Souvent, ❷ tache sombre derrière l'opercule.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Siganidae / Sigans

Siganus corallinus IGR

Sigan corail

Livrée jaune. ❶ Nombreux points bleus bordés de sombre sur la tête et le corps. ❷ Tache triangulaire sombre sur l'œil. Parfois, marques foncées sur le dos.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Brad Moore, SPC

IGD *Siganus doliatus*

Siganidae / Sigans

Sigan deux bandes




Photo : Biodiversity Institute of Onatrio

Haut du corps bleu clair, bas du corps blanc. 1 Lignes verticales bleues et jaunes sur le corps devenant longitudinales sur la poitrine et le pédoncule caudal.
2 Deux bandes sombres sur la tête et l'avant du corps.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Siganus virgatus* (pas de photo) mais s'en distingue par une suite de lignes, au lieu de points, sur le corps.

IGF *Siganus fuscescens*

Siganidae / Sigans

Sigan sombre




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Haut du corps gris à gris bleuté ou jaune brunâtre, ventre plus pâle.
1 Petits points or à blanc bleuté sur les flancs et le ventre.
2 Caudale légèrement incurvée.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

SGU *Siganus guttatus*

Siganidae / Sigans

Sigan raies d'or



Livrée gris bleuté pâle. 1 Nombreux points jaune-orange et 2 tache jaune vif sous la base postérieure de la dorsale.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Siganus lineatus* mais s'en distingue par sa livrée exclusivement ornée de points (lignes et points chez *S. lineatus*).

Siganidae / Sigans

Siganus lineatus IGI

Sigan lignes d'or

Livrée gris bleuté pâle. ❶ Nombreuses lignes longitudinales sinueuses jaune-orange et, parfois, taches sur le corps. ❷ Tache jaune vif derrière la base postérieure de la dorsale.

Longueur maximale : 40 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		



Ressemble à *Siganus guttatus* mais s'en distingue par la livrée de son corps, orné de lignes et de points.

Siganidae / Sigans


Siganus puellus IGE

Sigan masqué

Livrée jaune. ❶ Lignes bleues sinueuses verticales à l'avant du corps et longitudinales à l'arrière. ❷ Tête jaune virant au blanc sur le bord de l'opercule. ❸ Bande sombre en travers des yeux.

Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	GU	**KI**
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	WS		



Siganidae / Sigans

Siganus punctatissimus IGT

Sigan poivré

Livrée brun violacé foncé. ❶ Nombreux petits points blanc bleuté ou bleus à bruns. ❷ Bordure sombre sur l'arrière de la dorsale, anale et caudale. ❸ Caudale très fourchue.

Longueur maximale : 30 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		




Photo : Biodiversity Institute of Onatrio

IGC *Siganus punctatus*

Siganidae / Sigans

Sigan taches orange




Photo : Brad Moore, SPC

Livrée brun pâle à gris bleuté. 1 Nombreux points orange bordés de sombre sur la tête, le corps et la caudale. Souvent, 2 tache sombre à l'arrière de l'opercule.


Longueur maximale : 35 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

IUS *Siganus spinus*

Siganidae / Sigans

Petit sigan



Livrée blanche. 1 Lacis de bandes brunes étroites sur la tête et le corps. 2 Marbrures sur les nageoires.


Longueur maximale : 20 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

IUE *Siganus vermiculatus*

Siganidae / Sigans

Sigan vermicelle



Livrée blanc bleuté. 1 Lacis de lignes brun-jaune sur la tête et le corps. 2 Nombreux petits points sombres sur la caudale.

Longueur maximale : 44 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Siganus vulpinus IUL

Sigan renard

Corps jaune. ❶ Tête blanche et bande oblique noire du museau à la dorsale. ❷ Thorax noir.

Longueur maximale : 25 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Photo : Brad Moore, SPC




Sigan renard (*Siganus vulpinus*), Chuuk (États Fédérés de Micronésie).

Photo : Dwayne Meadows, NOAA Photo Library

GBA *Sphyraena barracuda*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Barracuda



Livrée argentée. 1 Barres fugaces sur les flancs, surtout vers la caudale. 2 Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. En général, 3 taches noires éparses sur le bas du corps. 4 Pointe blanche sur une ou plusieurs nageoires.


Longueur maximale : 170 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

YBS *Sphyraena forsteri*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Bécune de Forster



Long corps cylindrique et 1 grande mâchoire inférieure proéminente. Haut du corps gris bleuté ; flancs et ventre argentés. 2 Tache noire derrière la base des pectorales. 3 Seconde dorsale et anale sombres ; extrémité blanche.


Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

BAC *Sphyraena jello*

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Bécune jello



Haut du corps gris bleuté, flancs et ventre argentés. Environ 1 vingt barres verticales courtes sur le corps s'étendant jusqu'en-dessous de la ligne latérale. 2 Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. 3 Reflets jaunes sur la seconde dorsale et la caudale.

Longueur maximale : 140 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Sphyraena qenie* mais s'en distingue par des reflets jaunes sur la dorsale et la caudale (caudale de *S. qenie* bordée de noir).

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Sphyraena obtusata YRB

Bécune obtuse

Long corps cylindrique et mâchoire inférieure proéminente. Corps argenté avec ❶ deux bandes longitudinales fugaces brunes ou jaune brunâtre. ❷ Reflets jaunes sur la caudale.

Longueur maximale : 55 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	**WS**		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *Sphyraena flavicauda* (pas de photo) mais s'en distingue par l'absence de barres verticales courtes sur le corps. La répartition exacte de *S. obtusata* est méconnue en raison de la confusion entre les deux espèces.

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes

Sphyraena putnamae BAN

Bécune chevronnée

Livrée gris argenté. ❶ Nombreuses barres en chevron prononcées sur les flancs. ❷ Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. ❸ Caudale sombre.

Longueur maximale : 90 cm LF

AS	CK	**FJ**	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	**PF**
PG	PN	**PW**	SB	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		




Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *Sphyraena qenie* mais s'en distingue par des barres plus prononcées en forme de chevron sur les flancs. La répartition exacte de *S. putnamae* est méconnue en raison de la confusion avec *S. qenie*.

Sphyraenidae / Barracudas, bécunes


Sphyraena qenie BAB

Bécune bandes noires

Livrée gris argenté. ❶ Environ 18 à 22 barres sombres rectilignes ou légèrement en chevron sur les flancs. ❷ Grande mâchoire inférieure proéminente garnie de fortes dents. ❸ Caudale sombre bordée de noir.

Longueur maximale : 160 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Sphyraena putnamae* mais s'en distingue par des barres rectilignes sur les flancs. La répartition exacte de *S. qenie* est méconnue en raison de la confusion avec *S. putnamae*.

Violon jarbua



Livrée argentée. 1 Bandes brunes longitudinales incurvées sur le corps. 2 Caudale rayée ; extrémité du lobe supérieur sombre.

Longueur maximale : 32 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Bécunes bandes noires (*Sphyraena qenie*), Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Photo : Jan Messersmith, Flickr


Zanclus cornutus ZAO

Zancle

Avant du corps blanc, arrière jaune. ❶ Deux larges barres noires. ❷ Selle jaune-orange sur le museau.

Longueur maximale : 18 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		





Zancles (*Zanclus cornutus*), Tanga (Tanzanie). Photo : Ken Clifton, Flickr

Bibliographie complémentaire

Le présent guide vise à faciliter l'identification des requins, des raies et des poissons osseux les plus couramment observés dans les captures de pêche vivrière et sur les marchés au poisson des pays insulaires du Pacifique. Il ne prétend pas couvrir l'intégralité des espèces débarquées ou vendues sur les étals de la région. La capture occasionnelle d'espèces plus rares, non décrites ici, pourra nécessiter l'élaboration d'un autre guide d'identification. Le présent ouvrage ne traite pas des poissons d'aquariophilie (hormis ceux régulièrement consommés dans la région) ni, sauf rares exceptions, des espèces ciblées par les pêcheries hauturières à la palangre, les pêcheries de poissons profonds, ou encore les pêcheries d'invertébrés. La liste ci-dessous répertorie une partie des nombreux et excellents guides d'identification élaborés au profit de la région.

Autres guides d'identification d'espèces marines disponibles auprès de la Communauté du Pacifique (CPS) :

Anon. 2003. Fiches d'identification des tortures marines. Nouméa, Nouvelle-Calédonie: Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

Anon. 2004. Pacific Island sea cucumber and beche-de-mer identification cards. Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.

Anon. 2005. Identification des requins dans les pêcheries tropicales du Pacifique. Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Anon. 2013. Fiches d'identification des poissons profonds. Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Chapman L., Sharples P., Brogan D., Desurmont A., Beverly S. et Sokimi W. 2006. Manuel d'identification des espèces marines destiné aux pêcheurs à la palangre horizontale. Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Chapman L., Desurmont A., Choi Y., Boblin P., Sokimi W. et Beverly S. 2008. Manuel d'identification des poissons destinés aux pêcheurs de vivaneaux profonds. Secrétariat général de la Communauté du Pacifique, Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Pakoa K. and Barré C. 2013. Identification cards for marine invertebrate surveys in the Pacific Islands. Secretariat of the Pacific Community, Noumea, New Caledonia.

Guides d'identification des élasmobranches et des téléostéens d'Océanie :

Allen G.R. 2009. Field guide to marine fishes of tropical Australia and South-East Asia. Welshpool, Western Australia: Western Australian Museum.

Allen G.R., Steene R., Humann P., DeLoach N. 2003. Reef fish identification: tropical Pacific. Jacksonville, Florida: New World Publications, Inc.

Last P.R. and Stevens J.D. 2009. Sharks and rays of Australia. Collingwood, Victoria: CSIRO Publishing.

Lieske E. and Myers R. 2002. Coral reef fishes: Indo-Pacific and Caribbean (revised edition). Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Myers R.F. 1999. Micronesia reef fishes: A comprehensive guide to the coral reef fishes of Micronesia (3rd edition). Guam, USA: Coral Graphics.

Randall J.E. 2005. Reef and shore fishes of the South Pacific: New Caledonia to Tahiti and the Pitcairn Islands. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press.

Randall J.E., Allen G.R. and Steene R.C. 1997. Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea (2nd edition). Honolulu, Hawaii: University of Hawaii Press.

Guides génériques d'identification d'espèces intéressant l'Océanie :

Allen G.R. and Steene R. 1994. Indo-Pacific coral reef field guide. El Cajon, California: Odyssey Publishing Company.

Bacchet P., Zysman T. et Lefèvre Y. 2006. Guide des poissons de Tahiti et ses îles. Papeete, Polynésie française: éditions Au Vent des Îles.

Humann P. and DeLoach N. 2010. Reef creature identification: tropical Pacific. Jacksonville, Florida: New World Publications, Inc.

Laboute P. et Grandperrin R. 2000. Poissons de Nouvelle-Calédonie. Nouméa, Nouvelle-Calédonie: éditions Catherine Ledru.

Index

A

Acanthocybium solandri 105
Acanthurus achilles 15
Acanthurus auranticavus 15
Acanthurus bariene 15
Acanthurus blochii 16
Acanthurus dussumieri 16
Acanthurus guttatus 16
Acanthurus leucocheilus 17
Acanthurus lineatus 17
Acanthurus maculiceps 17
Acanthurus mata 18
Acanthurus nigricans 18
Acanthurus nigricauda 18
Acanthurus nigrofuscus 19
Acanthurus nigroris 19
Acanthurus olivaceus 19
Acanthurus pyroferus 20
Acanthurus triostegus 20
Acanthurus xanthopterus 20
Aethaloperca rogaa 108
Aetobatus ocellatus 13
Aiguillette crocodile 27
Aiguillette dentée 27
Albacore 107
Albula glossodonta 25
Alectis ciliaris 30
Anglais 69
Anyperodon leucogrammicus 108
Aphareus furca 68
Aphareus rutilans 68
Aprion virescens 68
Atule mate 30

B

Baliste géant 26
Baliste olivâtre 26
Baliste rude 26
Balistoides viridescens 26
Banane lèvre ronde 25
Barbure à six doigts 88
Barracuda 128
Beauclaire de Bloch 89
Beauclaire de roche 89
Beauclaire miroir 89
Bécune bandes noires 129
Bécune chevronnée 129
Bécune de Forster 128
Bécune jello 128
Bécune obtuse 129
Blanche armée 42
Blanche commune 43
Blanche élégante 43
Blanche fil 42
Blanche haute 42
Bodianus loxozonus 55
Bodianus mesothorax 55
Bolbometopon muricatum 90
Bonite 106
Bonite à dos rayé 105
Bonite à gros yeux 106
Bossu blanc à points noirs 60

C

Caesio à ventre rouge 28
Caesio azuror 28
Caesio caerulaurea 28
Caesio cuning 28
Caesio teres 28
Calicagère bleue 54
Calicagère brune 54
Calicagère lignes jaunes 54
Calotomus carolinus 90
Canthidermis maculata 26
Capucin à bande jaune 82
Capucin de Vanicolo 82
Carangue aile bleue 33
Carangue cuivrée 33
Carangue échevelée 30
Carangue joue barrée 32
Carangue lentigine 30
Carangue maquereau 34
Carangue noire 33
Carangue pailletée 31
Carangue points jaunes 32
Carangue rayée 31
Carangue royale 35
Carangue tapir 31
Carangue têtue 32
Carangue tille 34
Carangue vorace 34
Carangoides bajad 30
Carangoides chrysophrys 31
Carangoides ferdau 31
Carangoides fulvoguttatus 31
Carangoides orthogrammus 32
Carangoides plagiotaenia 32
Caranx ignobilis 32
Caranx lugubris 33
Caranx melampygus 33
Caranx papuensis 33
Caranx sexfasciatus 34
Caranx tille 34
Carcharhinus albimarginatus 10
Carcharhinus amblyrhynchos 10
Carcharhinus leucas 10
Carcharhinus limbatus 11
Carcharhinus melanopterus 11
Cephalopholis argus 108
Cephalopholis boenak 109
Cephalopholis cyanostigma 109
Cephalopholis formosa 109
Cephalopholis leopardus 110
Cephalopholis miniata 110
Cephalopholis sexmaculata 110
Cephalopholis sonnerati 111
Cephalopholis spiloparaea 111
Cephalopholis urodeta 111
Cetoscarus ocellatus 91
Chano 38
Chanos chanos 38
Cheilinus chlorourus 55
Cheilinus fasciatus 56
Cheilinus trilobatus 56
Cheilinus undulatus 57
Chirurgien à voile 24
Chirurgien bagnard 20
Chirurgien bande orange 19
Chirurgien bandes bleues 17
Chirurgien brun 19
Chirurgien chaussette orange 15
Chirurgien couronné 16
Chirurgien d'Achille 15
Chirurgien élancé 18
Chirurgien joue blanche 18
Chirurgien lèvres pâles 17
Chirurgien lignes bleues 18
Chirurgien moucheté 16
Chirurgien pectorale jaune 20
Chirurgien porteur de feu 20
Chirurgien queue rayée 16
Chirurgien strié 21
Chirurgien tête tachetée 17
Chirurgien virgule noire 18
Chiurgien tache noire *15*
Chlorurus bleekeri 91
Chlorurus frontalis 92
Chlorurus japanensis 92
Chlorurus microrhinos 93
Chlorurus spilurus 93
Choerodon anchorago 57
Choerodon schoenleinii 58
Comète maquereau 34
Comète saumon 35
Conger cinereus 39
Congre moustache 39
Cordonnier fil 30
Coryphaena hippurus 40
Coryphène commune 40
Crenimugil crenilabis 80
Croissant queue blanche 122
Croissant queue jaune 122

Cromileptes altivelis 112
Ctenochaetus striatus 21

D
Decapterus macarellus 34
Diagramme arlequin 44
Diagramme bagnard 47
Diagramme bandes diagonales 46
Diagramme citron 45
Diagramme grosses lèvres 46
Diagramme noir 45
Diagramma pictum 44
Diagramme raies d'or 45
Diagramme rayé 46
Diagramme taches blanches 44
Diagramme voilier 44

E
Elagatis bipinnulata 35
Empereur à bandes oranges 65
Empereur ambon 61
Empereur argenté 61
Empereur bas cou 66
Empereur bec-de-cane 67
Empereur bossu 67
Empereur capitaine 62
Empereur grandes nageoires 62
Empereur gris 61
Empereur gueule longue 65
Empereur honteux 66
Empereur large queue 63
Empereur lentille 64
Empereur lignes d'or 60
Empereur longue-épine 63
Empereur maillé 66
Empereur moris 64
Empereur orné 65
Empereur quatre raies blanches 67
Empereur queue jaune 62
Empereur Saint Pierre 63
Empereur tatoué 60
Epibulus insidiator 58
Epinephelus areolatus 112
Epinephelus chlorostigma 112
Epinephelus coeruleopunctatus 113
Epinephelus coioides 113
Epinephelus corallicola 113
Epinephelus cyanopodus 114
Epinephelus fasciatus 114
Epinephelus fuscoguttatus 114
Epinephelus hexagonatus 115
Epinephelus howlandi 115
Epinephelus lanceolatus 115
Epinephelus macrospilos 116
Epinephelus maculatus 116
Epinephelus malabaricus 116
Epinephelus melanostigma 117
Epinephelus merra 117
Epinephelus miliaris 117
Epinephelus ongus 118
Epinephelus polyphekadion 118
Epinephelus retouti 118
Epinephelus socialis 119
Epinephelus spilotoceps 119
Epinephelus tauvina 119
Euthynnus affinis 105

F
Fusilier à dos jaune et bleu 28
Fusilier à ligne olive 29
Fusilier à trois bandes 29
Fusilier de Marr 29

G
Gerres erythrourus 42
Gerres filamentosus 42
Gerres longirostris 42
Gerres oblongus 43
Gerres oyena 43
Gnathanodon speciosus 35
Gnathodentex aureolineatus 60
Gracila albomarginata 120
Grammatorcynus bilineatus 105
Gueule rouge 64
Gymnocranius euanus 60
Gymnocranius grandoculis 60
Gymnocranius griseus 61
Gymnocranius microdon 61
Gymnosarda unicolor 106
Gymnothorax fimbriatus 87
Gymnothorax flavimarginatus 87
Gymnothorax javanicus 87

H
Hemigymnus melapterus 58
Heteropriacanthus cruentatus 89
Himantura fai 14
Hipposcarus longiceps 94

K
Katsuwonus pelamis 106
Kyphosus bigibbus 54
Kyphosus cinerascens 54
Kyphosus vaigiensis 54

L
Labre insidieux 58
Labre moitié 55
Labre poitrine rouge 56
Labre tache en biais 55
Labre tacheté 55
Labre triple queue 56
Leiognathus equulus 59
Leiognathus fasciatus 59
Leptoscarus vaigiensis 94
Lethrinus amboinensis 61
Lethrinus atkinsoni 62
Lethrinus erythracanthus 62
Lethrinus erythropterus 62
Lethrinus genivittatus 63
Lethrinus harak 63
Lethrinus laticaudis 63
Lethrinus lentjan 64
Lethrinus miniatus 64
Lethrinus nebulosus 64
Lethrinus obsoletus 65
Lethrinus olivaceus 65
Lethrinus ornatus 65
Lethrinus rubrioperculatus 66
Lethrinus semicinctus 66
Lethrinus variegatus 66
Lethrinus xanthochilus 67
Listao 106
Liza macrolepis 80
Liza vaigiensis 80
Lune d'argent 79
Lutjanus adetii 69
Lutjanus argentimaculatus 69
Lutjanus bohar 69
Lutjanus boutton 70
Lutjanus carponotatus 70
Lutjanus ehrenbergii 70
Lutjanus fulviflamma 71
Lutjanus fulvus 71
Lutjanus gibbus 71
Lutjanus kasmira 72
Lutjanus lutjanus 72
Lutjanus malabaricus 72
Lutjanus monostigma 73
Lutjanus quinquelineatus 73
Lutjanus rivulatus 73
Lutjanus rufolineatus 74
Lutjanus russellii 74
Lutjanus sebae 74
Lutjanus semicinctus 75
Lutjanus timoriensis 75
Lutjanus vitta 75

M
Macolor macularis 76
Macolor niger 76
Mahi-mahi 40
Maidague défense 57
Maidague tache noire 58
Maquereau des Indes 106
Marignan à œillères 48
Marignan à taches noires 51
Marignan aile noire 50
Marignan ardoisé 49
Marignan rosé 52
Marignan rouge et argent 51

Marignan sabre 52
Marignan tacheté 51
Marignan tahitien 52
Marignan violacé 53
Megalops cyprinoides 78
Mérou à bout rouge 118
Mérou abeille 117
Mérou aréolé 112
Mérou bleu 114
Mérou bord rouge 120
Mérou bossu 112
Mérou camouflage 118
Mérou corail 113
Mérou des platiers 119
Mérou dossard 117
Mérou élégant 108
Mérou flocons 118
Mérou gâteau de cire 117
Mérou haute voile 116
Mérou lancéolé 115
Merou loutre 119
Mérou malabar 116
Mérou marron 114
Mérou mélifère 115
Mérou oriflamme 114
Mérou pintade 112
Mérou quatre selles 119
Mérou queue carrée 120
Mérou sellé (clair) 121
Mérou sellé (foncé) 120
Mérou sellé noir 115
Mérou taches blanches 113
Mérou taches oranges 113
Mérou tapis 116
Mérou-loche cacatois 122
Monodactylus argenteus 79
Monotaxis grandoculis 67
Monotaxis heterodon 67
Moolgarda seheli 81
Mugil cephalus 81
Mulet à grandes écailles 80
Mulet à grosse tête 81
Mulet boxeur 80
Mulet mopiro 80
Mulet tache bleue 81
Mulloidichthys flavolineatus 82
Mulloidichthys vanicolensis 82
Murène frangée 87
Murène javanaise 87
Murène points jaunes 87
Myripristis adusta 48
Myripristis amaena 48
Myripristis berndti 48
Myripristis kuntee 49
Myripristis murdjan 49
Myripristis pralinia 49
Myripristis violacea 50
Myripristis vittata 50

N

Napoléon 57
Naso annulatus 21
Naso brachycentron 21
Naso brevirostris 22
Naso caesius 22
Naso hexacanthus 22
Naso lituratus 23
Naso lopezi 23
Naso tonganus 23
Naso unicornis 24
Naso vlamingii 24
Nason à bosse 21
Nason à éperons bleus 24
Nason à éperons oranges 23
Nason allongé 23
Nason lèvres bleues 24
Nason lisse 22
Nason queue bleue 22
Nason rastapopoulos 23
Nason rostre court 22
Nason rostre long 21
Neoniphon opercularis 50
Neoniphon sammara 51
Neotrygon kuhlii 14

P

Parupeneus barberinoides 82
Parupeneus barberinus 83
Parupeneus ciliatus 83
Parupeneus crassilabris 83
Parupeneus cyclostomus 84
Parupeneus heptacanthus 84
Parupeneus indicus 84
Parupeneus insularis 85
Parupeneus multifasciatus 85
Parupeneus pleurostigma 85
Perroquet à six bandes 97
Perroquet à tête ronde 98
Perroquet barbe bleue 98
Perroquet bicolore 91
Perroquet bleu 93
Perroquet bossu vert 90
Perroquet braisé 102
Perroquet brûlé 93
Perroquet caméléon 95
Perroquet casqué 100
Perroquet commun 101
Perroquet de Forsten 97
Perroquet de Quoy 101
Perroquet de Schlegel 103
Perroquet des Carolines 90
Perroquet dorade 99
Perroquet haute dorsale 99
Perroquet haute épine 95
Perroquet japonais 92
Perroquet joue blanche 91
Perroquet joues vertes 100
Perroquet labyrinthe 102
Perroquet long museau 94
Perroquet marbré 94
Perroquet moitié 96
Perroquet museau vert 103
Perroquet pectorales jaunes 96
Perroquet rouge 104
Perroquet tatoué 92
Perroquet tricolore 104
Petit sigan 126
Platax boersii 41
Platax doré 41
Platax longues nageoires 41
Platax orbicularis 41
Platax rond 41
Platax teira 41
Plectorhinchus albovittatus 44
Plectorhinchus chaetodonoides 44
Plectorhinchus chrysotaenia 45
Plectorhinchus flavomaculatus 45
Plectorhinchus gibbosus 45
Plectorhinchus lessonii 46
Plectorhinchus lineatus 46
Plectorhinchus picus 46
Plectorhinchus vittatus 47
Plectropomus areolatus 120
Plectropomus laevis (foncé) 121
Plectropomus laevis (clair) 120
Plectropomus leopardus 121
Plectropomus maculatus 121
Plectropomus oligacanthus 122
Poisson lait 38
Polydactylus sexfilis 88
Pompaneau lune 37
Pompaneau muscadin 37
Priacanthus blochii 89
Priacanthus hamrur 89
Pseudobalistes flavimarginatus 26
Pterocaesio marri 29
Pterocaesio tile 29
Pterocaesio trilineata 29

R

Raie fouet 14
Raie léopard 13
Raie pastenague à points bleus 14
Raie pastenague queue ruban 14
Rastrelliger kanagurta 106
Requin bordé 11
Requin bouledogue 10
Requin corail 11
Requin dagsit 10
Requin gris de récif 10
Requin pointe blanche 10

Requin pointes noires 11
Requin-marteau halicorne 12
Rouget-barbet barberin 83
Rouget-barbet bicolore 82
Rouget-barbet cinnabare 84
Rouget-barbet deux selles 85
Rouget-barbet indien 84
Rouget-barbet lèvres épaisses 83
Rouget-barbet lignes blanches 83
Rouget-barbet lignes d'or 86
Rouget-barbet pastille 85
Rouget-barbet rayé 86
Rouget-barbet selle jaune 84
Rouget-barbet trois selles 85

S

Sapsap commun 59
Sapsap rayé 59
Sargocentron caudimaculatum 51
Sargocentron cornutum 51
Sargocentron spiniferum 52
Sargocentron tiere 52
Sargocentron tiereoides 52
Sargocentron violaceum 53
Saumonée léopard 121
Sauteur leurre 36
Sauteur sabre 35
Scarus altipinnis 95
Scarus chameleon 95
Scarus dimidiatus 96
Scarus flavipectoralis 96
Scarus forsteni 97
Scarus frenatus 97
Scarus ghobban 98
Scarus globiceps 98
Scarus longipinnis 99
Scarus niger 99
Scarus oviceps 100
Scarus prasiognathos 100
Scarus psittacus 101
Scarus quoyi 101
Scarus rivulatus 102
Scarus rubroviolaceus 102
Scarus schlegeli 103
Scarus spinus 103
Scarus tricolor 104
Scarus xanthopleura 104
Scomberoides lysan 35
Scomberoides tol 36
Scomberomorus commerson 107
Selar boops 36
Sélar coulisou 36
Selar crumenophthalmus 36
Sélar oeil de boeuf 36
Sélar queue jaune 30
Seriola dumerili 37
Sériole couronnée 37
Sigan corail 123
Sigan deux bandes 124
Sigan gris 123
Sigan lignes d'or 125
Sigan masqué 125
Sigan pintade 123
Sigan poivré 125
Sigan raies d'or 124
Sigan renard 127
Sigan sombre 124
Sigan taches orange 126
Sigan vermicelle 126
Siganus argenteus 123
Siganus canaliculatus 123
Siganus corallinus 123
Siganus doliatus 124
Siganus fuscescens 124
Siganus guttatus 124
Siganus lineatus 125
Siganus puellus 125
Siganus punctatissimus 125
Siganus punctatus 126
Siganus spinus 126
Siganus vermiculatus 126
Siganus vulpinus 127
Soldat brique 48
Soldat écarlate 49
Soldat pointes blanches 50
Soldat pomme de pin 49
Soldat pourpre 48
Soldat violacé 50
Sphyraena barracuda 128
Sphyraena forsteri 128
Sphyraena jello 128
Sphyraena obtusata 129
Sphyraena putnamae 129
Sphyraena qenie 129
Sphyrna lewini 12
Strongylura incisa 27
Symphorichthys spilurus 76
Symphorus nematophorus 77

T

Taeniura lymma 14
Tamarin vert 58
Tarpon indo-pacifique 78
Terapon jarbua 130
Thazard rayé indo-pacifique 107
Thazard-bâtard 105
Thazard-kusara 105
Thon dents de chien 106
Thon obèse 107
Thonine orientale 105
Thunnus albacares 107
Thunnus obesus 107
Trachinotus baillonii 37
Trachinotus blochii 37
Triaenodon obesus 11
Tylosurus crocodilus crocodilus 27

U

Upeneus taeniopterus 86
Upeneus vittatus 86

V

Variola albimarginata 122
Variola louti 122
Vieille aile noire 111
Vieille ananas 111
Vieille chocolat 109
Vieille de corail 110
Vieille étoiles bleues 109
Vieille fraise 111
Vieille la prude 108
Vieille léopard 110
Vieille lignes bleues 109
Vieille roga 108
Vieille Saint-Silac 121
Vieille six taches 110
Violon jarbua 130
Vivaneau à bande brune 75
Vivaneau à cinq bandes 73
Vivaneau à raies bleues 72
Vivaneau bourgeois 74
Vivaneau chien rouge 69
Vivaneau de nuit 69
Vivaneau de Timor 75
Vivaneau des mangroves 69
Vivaneau des Moluques 70
Vivaneau diable 77
Vivaneau drapeau 70
Vivaneau églefin 73
Vivaneau encrier 70
Vivaneau gibelot 71
Vivaneau gros yeux 72
Vivaneau hublot 74
Vivaneau job 68
Vivaneau lignes jaunes 74
Vivaneau malabar 72
Vivaneau maori 73
Vivaneau minuit 76
Vivaneau pagaie 71
Vivaneau plat 76
Vivaneau queue noire 71
Vivaneau rayures noires 75
Vivaneau rouillé 68
Vivaneau tidents 68
Vivaneau voilier 76

Z

Zancle 131
Zanclus cornutus 131
Zebrasoma velifer 24


Notes

Notes


PacFishID

Retrouvez les 320 espèces décrites dans ce guide sur l'application mobile PacFishID.

Installez l'app







Disponible sur App Store


DISPONIBLE SUR Google Play

Téléchargez sur Windows Store

Pacific Community
Communauté du Pacifique

UNION EUROPÉENNE

Australian Aid



Australian Aid

UNION EUROPÉENNE